

SOMMAIRE

ICHTHYOLOGIE

Etude des potentialités piscicoles du plan d'eau du Carreau-Franc à Marolles sur Seine, par Stanilas LAMARCHE, p. 53

BOTANIQUE

Observations floristiques à Valpuiseaux (91) en mai et juin 2001, par Marie-José PORTAS et Sabine GREGOIRE, p. 56

MALACOLOGIE

Liste des noms de mollusques terrestres et aquatiques cités pour le massif de Fontainebleau et ses environs, par Philippe VIETTE et Christophe PARISOT, p. 63

HISTOIRE

Lieudits, par MarieClaude CAZORAN, p. 91

DIVERS

Libres propos : Langue de bois, par Philippe BRUNEAU de MIRE, p. 50

Dons à l'association, p. 51

In memoriam : Dr Claude Mercié, par François du RETAIL, p. 51

In memoriam Feodor Jelenc, par Christophe PARISOT, p. 52



Langue de bois

Je hais la langue de bois comme le politiquement correct. C'est l'artifice qui sert à masquer les problèmes qu'on souhaite ne pas résoudre. C'est le fin du fin de l'hypocrisie politicienne. C'est l'expression de la couardise d'un monde avachi dans la cécité d'un confort sans perspectives. C'est le moyen d'étouffer ceux qui ont encore à dire. C'est le mal dont nous souffrons depuis tant d'années qui suscite l'action violente comme seule réponse efficace.

A cet égard il faut saluer le rapport GLASS comme un chef d'œuvre en la matière. Attendu depuis si longtemps il vient à point nommé pour lever les dernières illusions qu'il avait pu entretenir.

Pour comprendre, il faut se replacer dans le contexte. Après de longues péripéties l'affaire d'un Parc National revenait sur le devant de la scène en 1998 à l'occasion du cinquantenaire de l'UICN créé à Fontainebleau, entre autres par notre association, et célébré en grande pompe par le Gouvernement français. Déjà embarrassé par les exigences de Natura 2000 qu'il n'arrivait pas à satisfaire, malgré les engagements signés, faute de n'avoir su convaincre les lobbies concernés (forestiers, agriculteurs, chasseurs notamment), cette affaire de Parc venait mal à propos ranimer la discorde et rajouter au discrédit de l'incapacité de notre gouvernement à gérer les problèmes d'environnement. Convoqués chez le premier ministre, alarmé par de possibles désordres, on tenta de nous séduire par de vagues promesses. Faute de s'engager à cette création, la ministre de l'environnement de l'époque décida d'organiser un groupe de réflexion.

Il s'agit là d'une méthode sûre, d'efficacité reconnue, pour étouffer l'affaire. Laisser les gens s'exprimer vaut mieux que leur clouer le bec. Surtout si c'est entre quatre murs et sans présence des médias. Pour plus de sûreté, on confia la présidence du groupe au professeur DORST aujourd'hui décédé, alors en délicatesse avec la Cour des Comptes et l'Office National des forêts pour la malheureuse affaire du Parc de la Haute-touche, traitée avec légèreté par le Muséum. C'était la garantie que les solutions proposées épargneraient l'ONF à cette époque farouchement hostile à l'instar de certains élus à l'idée d'un Parc National. C'était pour quelques scientifiques plus préoccupés de leur carrière que de l'avenir de nos enfants la garantie d'une manne pour services rendus, désavouant ainsi les vœux oubliés de l'assemblée des professeurs du Muséum et de l'Institut de France.

A la surprise des organisateurs, et malgré l'habileté du rédacteur, les conclusions du rapport ne parvenaient pas à écarter l'idée du Parc national soutenue par la majorité des intervenants, mais proposait, pour diluer le propos, des solutions alternatives reposant toutes sur l'idée de la création d'un établissement public autonome. Aussi, malgré la promesse d'une prompt décision, ces conclusions furent sagement mises au placard en attendant des jours meilleurs.

Cependant les tenants d'un Parc ne désarmaient pas. Après de vaines réclamations, deux ans après la remise du rapport, on décidait enfin une audit confiée à Bernard GLASS, ingénieur général du Génie rural, chargé d'en analyser les conclusions pourtant limpides. Il consulta à ce sujet divers intervenants du groupe de travail mais je doute qu'il ait eu connaissance de la totalité du dossier car je dus moi-même lui procurer copie de documents issus des réunions de ce groupe qui lui restaient inaccessibles parce qu'ensevelis dans les archives sans fond du ministère.

De la conversation que nous avons pu avoir en compagnie de quelques collègues il ne subsiste guère dans le rapport. Des contrevérités, rien que des considérations manifestement dictées par d'autres préoccupations que celles de la protection d'un sanctuaire qui est le seul à accueillir en exclusivité la moitié et au total les deux tiers des espèces protégées dans nos régions. Il suffit de lire les écrits de ceux qui ont la charge, réserve de biosphère ou forêt de protection, et tentent avec ténacité de banaliser son contenu pour comprendre qu'il s'agit d'une politique délibérée, voulue et commandée par certains. Et conduite dans quel but me direz-vous ? Une confidence : nos édiles veulent organiser à Fontainebleau un championnat international de course d'orientation en VTT. La réponse est simple et tient dans ce constat : faire de la forêt un gigantesque parc d'attractions où la nature n'aura rien à gagner mais où certains s'empliront les poches.

Philippe BRUNEAU de MIRE

Dons à l'association

L'association a bénéficié de plusieurs dons importants qui sont venus enrichir la bibliothèque et les collections d'insectes :

Monsieur Thierry Cantonnet, fils de François Cantonnet, nous a légué 12 boîtes à insectes supplémentaires de la collection de son défunt père. En effet, le leg de François Cantonnet de son vivant concernait toute sa collection de Coléoptères (représentant une bonne partie de la faune de France) ainsi que sa collection d'Hétéroptères. Quelques boîtes concernant d'autres groupes avaient été partagés entre ses enfants. Aussi, Thierry Cantonnet, suite à la demande de Lionel Casset de consulter une de ces boîtes, a décidé de les léguer à l'ANVL en novembre 2001. Il s'agit des collections de Diptères, Orthoptères, Odonates, Névroptères et Dermaptères, cette dernière collection ayant servi à l'élaboration de la Faune de France de ce groupe.

Monsieur Jean Ducatel, résidant à Avon et ancien pharmacien d'Héricy, a choisi l'ANVL pour léguer sa bibliothèque naturaliste. Son âge ne lui permettant plus d'exercer d'activités naturalistes et ne souhaitant pas jeter ses ouvrages, Monsieur Jean Ducatel nous les a remis en compagnie de ses filles en novembre 2001. Cette bibliothèque comporte notamment d'excellents ouvrages en mycologie et botanique qui ont rejoint la bibliothèque de l'ANVL que le précédent don de M. Jean Capelle en 1999 avait déjà beaucoup enrichi. Cela a été également une occasion pour commencer une importante opération de rangement au niveau de notre bibliothèque.

Enfin, Monsieur et Madame Lanceny, légataire universel de Mme Iablokoff, épouse de Arthur Iablokoff, ancien président de l'ANVL et éminent naturaliste, nous ont fait, de nouveau, dons d'ouvrages et bulletins ayant appartenu à M. Iablokoff.

Que toutes ces personnes qui contribuent par leur don au renouvellement et à la bonne tenue du fond documentaire de l'ANVL soient ici chaleureusement remerciées. Toutes ces nouvelles références sont consultables à notre local le mercredi ou les autres jours sur rendez-vous sauf le week end et jours fériés.

NECROLOGIES

In Memoriam : Dr Claude Mercié

Notre collègue le Docteur Claude Mercié est décédé le 8 mars 2001. A l'A.N.V.L. depuis 1943, Président de notre Association en 1949, Administrateur, Collaborateur du bulletin, il était spécialiste en pédiatrie et bien connu à Fontainebleau où il était apprécié par les familles pour ses soins aux enfants. Chef d'un service hospitalier, il recevait les jeunes malades. Les enfants étant plus exposés que les adultes et plus vulnérables aux morsures de vipères, Claude Mercié pour ces raisons s'était tout particulièrement intéressé à ces reptiles assez fréquents en forêt et dans notre région.

Dans le bulletin de mai-juin 1977 est rappelée l'expérience d'une morsure de vipère vécue sur lui-même. Le 3 mai 1970 aux 6èmes journées médicales de Fontainebleau, notre collègue présenta une communication avec diapositives sur les morsures de vipères. Le bulletin de juin 1978 donne des précisions fort utiles sur la morsure de *Vipera aspis*, ses symptômes, ses conséquences, son traitement, le venin, ses propriétés, la vipère dans son milieu, son comportement, le danger des morsures sur les enfants au-dessous de huit ans. Le bulletin de juillet-août de la même année apporte des conseils pratiques pour secourir rapidement un promeneur victime d'une morsure.

Dans celui de janvier 1982 une réflexion de Claude Mercié, suite à l'arrêté paru en 1980 sur la protection des vipères, apporte une réponse judicieuse sur les moyens de limiter les risques de morsures sans détruire pour autant les reptiles. Dans toutes les notes du bulletin sur le sujet et interventions lors des sorties, des conseils et rappels pour le traitement des victimes de morsures sont apportés clairement. Toujours, notre collègue dans ses activités naturalistes, ses observations sur le terrain, tirait des enseignements pour apporter, soulagement, guérison aux naturalistes et autres promeneurs dans la nature.

Son attention, ses conseils, se sont aussi portés sur la maladie de Lyme, infection bactérienne transmise par la Tique *Ixodes ricinus* très commune en forêt. Une note parue au bulletin n°4 de 1987, réalisée par les deux confrères, le Docteur François Cantonnet sur la Tique proprement dite, sa description, sa biologie et sur la maladie de Lyme par le Docteur Claude Mercié, l'histoire de la maladie, diagnostic et traitement, apporte de précieuses indications sur le moyens d'enrayer le développement du mal.

Il nous apparaît bien normal de souligner tout ce travail si utile, intéressant, réalisé par notre collègue qui a eu la douleur sur la fin de sa vie de perdre son plus jeune fils Vincent, guide en montagne, puis quelques années après, son épouse. A sa fille, à son fils, à ses petits enfants, les naturalistes qui l'ont bien connu tiennent à leur dire, qu'ils gardent de leur Père et Grand-père, un bien sympathique, attachant et fidèle souvenir pour son amabilité, sa gentillesse, son écoute, sa culture, ses connaissances et sa simplicité.

François Du Retail.

In memoriam :Féodor Jelenc

Nous apprenons, par le bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, le décès de Féodor Jelenc survenu le 10 août 2001 à l'âge de 90 ans. Féodor Jelenc était membre de l'ANVL depuis 1949. Professeur de métier, Féodor Jelenc s'intéressait à la bryologie et à la botanique. De par son éloignement, il n'était pas actif à l'ANVL mais consacrait beaucoup de temps à la SBCO et à la Société des Sciences de Châtellerault où il organisait de nombreuses sorties. On citera parmi ses nombreuses publications : une « contribution à l'étude de la flore vasculaire du département de la Vienne », publication annuelle sur au moins 12 ans ; plusieurs notes d'information sur les plantes qu'il observait au cours de l'année ; des comptes rendus d'excursions ; plusieurs articles sur le jardin et le parc botanique du Verger à Châtellerault ; de nombreux autres articles notamment sur *Tulipa sylvestris* et sur la Graphiose de l'Orme...

Nous présentons à Mme Germaine Jelenc, ainsi qu'à ses fils, nos plus sincères condoléances.

Christophe Parisot

ICHTHYOLOGIE

Etude des potentialités piscicoles du plan d'eau du Carreau-Franc à Marolles sur Seine Août 2001

par Stanislas Lamarche¹

1. Objectif de l'étude

Evaluer les potentialités piscicoles du plan d'eau du Carreau-Franc après plusieurs années d'observations d'oiseaux ichthyophages présents sur le site.

2. Appui technique et suivi

Conseil Supérieur de la Pêche – Stanislas Lamarche

Cellule nationale de développement et de vulgarisation des méthodes de gestion de la faune piscicole.

3. Méthodologie

Ce plan d'eau est une ancienne carrière d'extraction de sable aménagée en réserve ornithologique. A ce titre, elle est classée par arrêté de biotope (arrêté préfectoral du 19 septembre 1991). La nappe alluviale est son principal mode d'alimentation. Elle est située dans le lit majeur proche de la confluence des deux grandes rivières, l'Yonne et la Seine avec lesquelles les eaux superficielles ne communiquent jamais. En outre, aucune introduction volontaire d'espèces piscicoles n'a été réalisée depuis les dix dernières années. Au cours de la matinée du 11 août 2001, un protocole expérimental a été établi avec le concours de la Direction de l'eau du Conseil Général, propriétaire et l'A.N.V.L. gestionnaire du site.

Les habitats aquatiques de nutrition, de reproduction et d'abris-repos exerçant une attraction variable sur les différentes espèces de poissons, le protocole expérimental repose sur l'échantillonnage de chacun des habitats présents dans le plan d'eau. Cette prospection systématique est rendue possible par l'utilisation d'un outil bien adapté : le filet maillant de type tramail. Chaque filet mesure 10 mètres de longueur et varie de 1,40 m à 2 m de hauteur. Il permet l'échantillonnage de toute la tranche d'eau. Le matériel prévu, seulement trois filets de mailles différentes (10, 27 et 70 mm) ont été installés au cours de la veille et le protocole utilisé présentent l'avantage de prélever dans l'ensemble des trois classes de taille peu d'individus (la surface tendue étant limitée) tout en conservant un échantillon comparable à celui obtenu par des procédés classiques.

3.1 Résultats de l'étude hydrobiologique

3.1.1 Analyse du peuplement piscicole

1. filet □ 10 mm à la cote NGF 51.50

Esp. : Perche soleil <i>Lepomis gibbosus</i> ,	Long. : 119 mm, Poids : 32 g
Perche soleil <i>Lepomis gibbosus</i> ,	Long. : 125 mm, Poids : 42 g
Perche soleil <i>Lepomis gibbosus</i> ,	Long. : 121 mm, Poids : 36 g

2. filet □ 27 mm à la cote NGF 50.03

Esp. : Brochet <i>Esox lucius</i> ,	Long. : 159 mm, Poids : 21 g
Rotengle <i>Scardinius erythrophthalmus</i> ,	Long. : 162 mm, Poids : 72 g

¹ Brigadier chef du Conseil Supérieur de la Pêche

Rotengle *Scardinius erythrophthalmus*, Long. : 163 mm, Poids : 63 g

Poisson-chat *Ictalurus melas* Long : 161 mm

Poisson-chat *Ictalurus melas* Long : 158 mm

3. filet □ 70 mm à la cote NGF 49.52

Esp. : Brochet *Esox lucius*, Long. : 980 mm, Poids : > 7000 g

Devant le faible nombre d'individus capturés, il est délicat de parler véritablement de structure de la population. On notera cependant que :

Sur l'échantillonnage 1 la perche soleil, malgré un habitat particulièrement favorable est peu représentée. Sur l'échantillonnage 2 le Rotengle, poisson magnifique est représenté seulement par deux juvéniles de la même classe d'âge. Une suppression de pêche ou de prédation sur cette espèce par les oiseaux ichtyophages est soupçonnée. Sur l'échantillonnage 3 la capture unique d'un gros poisson était prévisible. Le Brochet trouve dans ce plan d'eau des conditions particulièrement favorables à son développement en rapport avec la très forte occupation spatiale des végétaux aquatiques (nombreuses zones pourvues de Potamot et de Myriophylle)

Remarque :

Il faut noter la sous exploitation du stock des gros individus vieillissants (Carpe/Brochet), qui seront victimes un jour d'une pathologie qui décimera cette classe d'âge pour rétablir une population mieux équilibrée. Concernant la Carpe, une pathologie dont l'origine bactérienne n'est pas établie vient de provoquer la mort de près de 150 individus (1^{er} juillet 2001)

3.1.2 Analyse des macro-invertébrés benthiques

Le peuplement d'invertébrés benthiques constitue un maillon essentiel de l'édifice trophique de l'écosystème aquatique. Son étude est complémentaire de l'approche physico-chimique.

Le protocole recommandé, l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) applicable au cours d'eau de faible profondeur a été adapté pour permettre des conditions d'échantillonnage suffisant pour l'analyse des macro-invertébrés benthiques qui constituent une part plus ou moins importante de la nourriture des poissons. Plusieurs prélèvements à l'aide d'une drague ont été réalisés en fonction des différents substrats rencontrés.

Taxons : - Trichoptères	Famille : <i>Limnephilidae, Sericostomatidae</i>
- Ephéméroptères	<i>Baetidae, Caenidae</i>
- Diptères	<i>Chironomidae</i>
- Odonates	<i>Calopterygidae</i>
- Mollusques	<i>Limnaeidae</i>
- Oligochètes	

3.2 Synthèse des paramètres physico-chimiques mesurés

L'alimentation des eaux par la nappe phréatique relativement tempérées par rapport aux eaux de surface (20,2°C) confère aux carrières une relative inertie vis-à-vis du contexte climatique général. Il en résulte un gradient thermique stable en période estivale. Parallèlement, le paramètre oxygène dissous (5,6 mg/l) peut se stratifier de manière assez forte selon la saison. Celui-ci est lié à la nature du substrat traversé par la nappe et à l'activité photosynthétique des végétaux chlorophylliens. Cette dynamique est modulée par le brassage mécanique des vents qui suffit à mélanger les eaux. Confirmant la bonne qualité des eaux de la nappe, le pH (7,9) et la conductivité (285 µs) indiquent un taux de minéralisation en rapport avec la qualité du substrat. La concentration en chlorophylle n'a pas été mesurée, cependant, la transparence (>60 cm) détermine la quasi-absence de particules en suspension traduisant une production primaire assez faible.



Relevage des filets lors de la pêche du 11 aout 2001



Cadavres des carpes récupérées lors de la mortalité de début juillet 2001
(clichés Christophe Parisot)

BOTANIQUE

OBSERVATIONS FLORISTIQUES A VALPUISEAUX (91) EN MAI ET JUIN 2001


Compte-rendu de la sortie ANVL du 24 Juin 2001

dirigée par Marie-José PORTAS et Sabine GREGOIRE ainsi que des sorties préparatoires.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Un peu en retrait du territoire habituellement prospecté par l'ANVL, cette herborisation fut riche en découvertes floristiques. En effet, **4 espèces protégées régionales** et **56 espèces en raréfaction (AR, R et TR)** y ont été recensées à l'occasion des sorties préparatoires et de la sortie de la belle journée caniculaire du 24 juin 2001.

Au sein des paysages vallonnés du sud de l'Essonne typiques du Gâtinais Français, nous avons arpenté les sentiers des communes de Valpuiseaux pour la matinée (Zone 1) et de Maisse/Gironville sur Essonne pour l'après-midi (Zone 2) après un pique-nique au Bois de la Justice.



Pourvu de pelouses calcicoles, le sud de l'Essonne accueille de nombreuses espèces méridionales qui se trouvent généralement en limite de répartition géographique en Ile-de-France.

C'est ce qui explique l'abondance des espèces rares et protégées dans ces milieux et que nous avons recensées.

Notons également que les plantes messicoles (adventices des cultures) sont sous prospectées et par conséquent peuvent être classifiées comme rares ce qui pourrait ne pas correspondre à la réalité. Par ailleurs, les divers traitements que subissent les cultures (traitements herbicides notamment) sont également responsables de la régression de cette flore. Il est possible que la flore réapparaitrait à l'arrêt des traitements à la condition que la banque de graines du sol soit présente.

Particulièrement présentes dans la première partie de la sortie, les pelouses font l'objet d'un programme de protection mené par le Conseil Général de l'Essonne avec inscription comme zone de préemption de quelques pelouses sèches du site de Valpuiseaux. Le site visité l'après-midi est quant à lui, inscrit en partie dans l'inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique), version réactualisée 1992 (GEPANA, 1992).

Les pelouses sèches sont en régression partout en Europe : la disparition des troupeaux de moutons et par conséquent l'abandon du pâturage de ces espaces ont induit une reprise de la dynamique naturelle : reboisement et fermeture du milieu. L'utilité économique ayant disparue, ces milieux régressent ainsi que la faune et la flore qui les caractérise. Certaines ont servies à des activités plus rentables : aménagements divers, sylvicultures, cultures intensives, urbanisation... Par ailleurs, ces pelouses sont fréquemment enclavées au sein de cultures intensives ou situées à proximité de zones anthropisées. Ces situations sont également sources de dégradations et de destructions de ces milieux à valeur biologique élevée. Reconnues comme habitat naturel d'intérêt communautaire par la **Directive européenne Habitat** (C.E.E. 92/43 du 21 mai 1992), leur conservation est déclarée comme prioritaire. Par ailleurs, certaines espèces recensées sont légalement protégées par les textes de loi français.

Outre sa valeur floristique et phytosociologique, il faut bien reconnaître que les pelouses sèches possèdent un **intérêt historique et paysager**. En effet, témoins des anciennes pratiques culturales (pâturage), les pelouses sèches possèdent un faciès original et particulier exprimant cet ancien mode de gestion des espaces ruraux. Identités paysagères locales, elles apportent de plus une diversité qui rompt avec le paysage habituel et forment un élément paysager relictuel des territoires ruraux. Ce qui s'avère de plus en plus rare surtout en région parisienne...

LES FORMATIONS VEGETALES RENCONTREES (selon Bournérias 1979)

* Pelouse calcicole ouverte (*Xerobromion*)

« Pelouses rases laissant voir fréquemment le sol » (Bournérias, 1979), « cette pelouse est probablement le type primaire des pelouses sèches, ayant un caractère relictuel (Wolkinger et Planck, 1981). Composées en majorité de plantes herbacées vivaces, adaptées à se développer sur un sol en condition de stress nutritif et hydrique (type rendzine), ces pelouses sont qualifiées de sèches et parfois d'arides. Bien représentée à Valpuiseaux, les espèces caractéristiques de cette formation que nous avons observées sont : *Helianthemum appeninum*, *Linum tenuifolium*, *Trinia glauca*, ...

* Pelouse héliophile calcicole dense (*Mesobromion*)

Moins thermophile que la formation précédente, le *Mesobromion* se caractérise par une haute pelouse dense avec de nombreuses floraisons échelonnées (Orchidées puis Composées puis Ombellifères) ainsi que la présence de buissons dispersés (Eglantiers, Genévriers) pionniers de la formation suivante : le prébois-calcicole. Les espèces caractéristiques du *Mesobromion* observées sont : *Orchis ustulata*, *Orchis simia*, ...



Orchis ustulata (Valpuiseaux, Essonne, Mai 2001)

cliché : S. Grégoire

*** Pré-bois thermophile calcicole**

Cet espace de transition entre les pelouses vues précédemment (notamment le *Mesobromion*) et les forêts calcicoles denses est bien représenté sur les 2 zones prospectées. L'aspect du paysage représente une mosaïque entre les pelouses piquetées de buissons bas et irréguliers et les boisements. Les espèces caractéristiques de ce milieu que nous avons pu observer sont :

Dans l'ourlet : *Limodorum abortivum*, *Veronica teucrium*, *Carduncellus mitissimus*, *Inula hirta*, ...

Dans le manteau : *Juniperus communis*, *Viburnum lantana*, ...

*** Chênaie pubescente (*Quercion pubescenti-petraea*)**

La Chênaie pubescente représente le stade ultérieur du pré-bois calcicole avec une strate arbustive dense. Cette formation se développe sur sol calcaire et est thermophile. Elle constituée notamment de Chênes pubescents (*Quercus humilis*). Elle est bien représentée à Valpuiseaux.

*** Pelouse calcicole sableuse à *Artemisia campestris* et *Silene otites* (*Koelerion albescentis*)**

Cette formation végétale s'observe au niveau des affleurements de Sable de Fontainebleau. Enclavé dans les pelouses calcicoles typiques, ce groupement pionnier témoigne d'un sol très sec et très chaud, plus ou moins dénudé. Il supporte peu le piétinement important.

On y trouve notamment : *Trinia glauca*, *Artemisia campestris*, *Pulsatilla vulgaris*, *Sedum album*, ...



Pulsatilla vulgaris (Valpuiseaux, Essonne, Mai 2001)

cliché : S. Grégoire

*** Peuplement de résineux**

Arbres (Pins sylvestres et Pins noirs) largement introduits, par plantation ou semis, au sein de groupements les plus divers (friches, *Mesobromion*, pelouses...). Ces peuplements se sont, par la suite, largement installés par dissémination naturelle. On y trouve le Monotrope (*Monotropa hypopitys*).

On constate par ailleurs à Valpuiseaux la colonisation de ce peuplement par le Chêne pubescent ce qui témoigne d'un retour de la chênaie pubescente.

* Cultures (Caucalion)

Relativement riches en cultures, les 2 sites prospectés révèlent de nombreuses adventices dont la plupart recensées sont en raréfaction comme : *Orlaya daucoides*, *Adonis annua*, *Scandix pecten-veneris*.... Ces espèces sont des caractéristiques des moissons sur sols calcaires plus ou moins caillouteux et représente un véritable intérêt floristique majoré dès lors que les cultures sont dispensées de traitements herbicides.

* Friches et zones anthropisées

Les sites prospectés révèlent de nombreuses friches héliophiles appartenant à l'association *Onopordion acanthii* avec *Carduus nutans*, *Reseda lutea*, *Bromus sterilis*...

BIBLIOGRAPHIE

BOURNERIAS M., 1979 : Guide des groupements végétaux de la région parisienne, 3^{ème} édition, SEDES, Paris, 484 pages.

DE LANGHE J-E « et al. », 1983 : Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, 3^{ème} édition, Editions du Patrimoine du Jardin national de Belgique, 1016 pages.

FONTAINE A., URBANO S., 1996 : Protection des pelouses sèches de l'Essonne – premier bilan ; Les Cahiers de NaturEssonne n°6, 26 pages.

GEPANA, 1992 : Notice de présentation de l'inventaire ZNIEFF réactualisé, DIREN-IDF/CSRPN-IDF, Paris, 26 pages.

JEANPERT H.E., 1995 : Vade-mecum du botaniste dans la région parisienne, Librairie René Thomas, 231 pages.

PIERRON V, 1996 : Diagnostic écologique et propositions de gestion de deux pelouses calcicoles du Gâtinais Essonnien, Rapport de stage, CENS 91 et IUP/Université Paris 7, 100 pages.

RELEVÉ FLORISTIQUE (Mai et Juin 2001)

Légende :

TC : Très Commun,
C : Commun
AC : Assez Commun
AR : Assez Rare
R : Rare
TR : Très Rare
PR : Protégée Régionale
SNA : Subnaturalisée
NRR : Non Revue Récemment

NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	Indice de rareté	Statut
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	TC	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	TC	
<i>Aceris anthropophorum</i>	Orchis homme-pendu	AR	
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée	TC	
<i>Acinos arvensis</i>	Calament acinos	AC	
<i>Adonis aemula</i>	Adonis d'automne	TR	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	TC	
<i>Aira praecox</i>	Canche printanière	AC	
<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	AC	
<i>Ajuga genevensis</i>	Buble de genève	AC	
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	TC	
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde	AK	
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	C	
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthe réfléchie	AC	
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	AC	
<i>Anagallis arvensis</i>	Mouron rouge	TC	
<i>Anchusa arvensis</i>	Buglosse des champs	C	
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	TR	SNA
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	TC	
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Anthyllis vulnéraire	AC	
<i>Apera spica-venti</i>	Agrostis jouet-du-vent	C	
<i>Aphanes arvensis</i>	Aphane des champs	C	
<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée	C	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuille de serpolet	TC	
<i>Armeria arenaria</i>	Armerie faux-plantain	AC	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental	TC	
<i>Artemisia campestris</i>	Armoise champêtre	AR	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	TC	
<i>Arum italicum</i>	Arum d'Italie	AC	
<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge officinale	TC	
<i>Asperula cynanchica</i>	Herbe à l'esquinancie	AC	
<i>Asplenium trichomanes</i>	Doradille fausse-capillaire	AC	
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Régliasse sauvage	AC	
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC	
<i>Avena fatua</i>	Folle-avoine	C	
<i>Ballota nigra</i>	Ballote fétide	C	
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	C	
<i>Bifora radians</i>	Bifora rayonnante	NRR	
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Chlore perfolié	AC	
<i>Consolidida regalis</i>	Pied d'alouette	AR	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	TC	
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	TC	
<i>Coronilla minima</i>	Coronille naine	AR	
<i>Coronilla varia</i>	Coronille variée	C	
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	TC	
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à 1 style	TC	

NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	Indice de rareté	Statut
<i>Bombacilaena erecta</i>	Micrope dressé	AR	
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Brachypode penné	TC	
<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire	C	
<i>Bromus arvensis</i>	Brome des champs	TR	
<i>Bromus erectus</i>	Brome dressé	C	
<i>Bromus hordaceus</i>	Brome mou	TC	
<i>Bromus sterilis</i>	Brome stérile	TC	
<i>Bromus tectorum</i>	Brome des toits	AC	
<i>Bryonia dioica</i>	Bryone dioïque	TC	
<i>Bumias orientalis</i>	Bumias d'orient	TR	SNA
<i>Bunium bulbocastanum</i>	Bunium noir-de-terre	TR	
<i>Bupleurum falcatum</i>	Buplèvre en faux	C	
<i>Calepina irregularis</i>	Calepine irrégulière	TR	SNA
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	TC	
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	TC	
<i>Carduncellus mitissimus</i>	Carduncelle molle	AR	PR
<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché	AC	
<i>Carex flacca</i>	Laiche glauque	TC	
<i>Carlina vulgaris</i>	Carline commune	C	
<i>Carthamus lanatus</i>	Carthame laineux	R	SNA
<i>Catapodium rigidum</i>	Catapode rigide	AC	
<i>Caucalis platycarpus</i>	Caucalis à fruits aplatis	TR	
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Calcitrape	TR	
<i>Centaurea cyanus</i>	Bleuet	AR	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centauree scabieuse	C	
<i>Centaurea thuillieri</i>	Centauree de Thuillier	C	
<i>Centaureum erythraea</i>	Erythrée petite centaurée	TC	
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Céraiste à 5 étamines	AC	
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite linaire	C	
<i>Chenopodium album</i>	Chenopode blanc	C	
<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chenopode fétide	TR	
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC	
<i>Cichorium intybus</i>	Cichorée sauvage	C	
<i>Cirsium acaule</i>	Cirse acaule	C	
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	TC	
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commune	TC	
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	TC	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	TC	
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	C	
<i>Fumaria parviflora</i>	Fumeterre à petites fleurs	R	
<i>Fumaria vaillantii</i>	Fumeterre de Vaillant	R	
<i>Galeopsis angustifolia</i>	Galéopsis à feuilles étroites	AR	
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	TC	
<i>Galium mollugo</i>	Caille-lait blanc	TC	
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	TC	

<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	TC		<i>Geranium colombinum</i>	Géranium des colombes	C	
<i>Crepis setosa</i>	Crépis hérissée	AC		<i>Geranium pusillum</i>	Géranium fluet	C	
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisetie	TC		<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	R	
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent	AC		<i>Glechoma hederacea</i>	Gléchome à feuilles de lierre	TC	
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balai	TC		<i>Globularia vulgaris</i>	Globulaire commune	AR	
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré	TC		<i>Goodyera repens</i>	Goodyère rampante	AR	
<i>Datura stramonium</i>	Stramoine	AC		<i>Hedera helix</i>	Lierre	TC	
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	TC		<i>Helianthemum appeninum</i>	Hélianthème des Appenins	AC	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	AR		<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème jaune	AC	
<i>Dipsacus sylvestris</i>	Cabaret des oiseaux	TC		<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce	TC	
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	TC		<i>Herniaria glabra</i>	Herniaire glabre	AC	
<i>Elytrigia repens</i>	Chiendent rampant	TC		<i>Hieracium pilosella</i>	Piloselle	C	
<i>Epipactis atrorubens</i>	Epipactis brun-rouge	AR		<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	AC	
<i>Epipactis helleborine</i>	Helleborine	TC		<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	TC	
<i>Erodium cicutarium</i>	Bec de grue commun	TC		<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C	
<i>Erophila verna</i>	Drave printanière	C		<i>Hypocrepis comosa</i>	Hippocrépide en ombelle	C	
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	TC		<i>Iberis amara</i>	Iberis amer	AR	PR
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cypres	C		<i>Inula conyza</i>	Inule conyze	C	
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	C		<i>Inula hirta</i>	Inule hérissée	R	
<i>Euphrasia stricta</i>	Euphrase raide	AC		<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	AC	
<i>Evonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	TC		<i>Juniperus communis</i>	Genévrier commun	AC	
Falcaria vulgaris	Falcaire commune	R	PR	<i>Kickxia elatine</i>	Linaire elatine	AC	
<i>Festuca ovina gr.</i>	Fétuque ovine (groupe)	TC		<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	TC	
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil commun	C		<i>Koeleria pyramidata</i>	Koelerie pyramidale	AC	
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaie	TC		<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	TC	
<i>Fumana procumbens</i>	Fumana couchée	AR		<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	TC	
<i>Lapsana communis</i>	Lapsane commune	TC		<i>Orobancha amethystea</i>	Orobancha améthyste	AC	
Lathyrus pratensis	Gesse des prés	TC		<i>Orobancha picridis</i>	Orobancha du picris	AC	
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	C		<i>Papaver argemone</i>	Argemone	R	
<i>Legousia hybrida</i>	Légousie hybride	AR		<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot	TC	
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Miroir de Vénus	AR		<i>Pastinaca sativa</i>	Panais	TC	
<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide	AC		<i>Petrorhagia prolifera</i>	Œillet prolifère	AC	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène	TC		<i>Petroselinum segetum</i>	Persil des moissons	TR	
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	R		<i>Phleum pratense</i>	Fléole	TC	
<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée	AC		<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse-epervière	TC	
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	TC		<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit boucage	C	
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	C		<i>Pinus nigra</i>	Pin noir	P	
<i>Linum tenuifolium</i>	Lin à feuilles étroites	AR		<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	C	
<i>Listera ovata</i>	Listère ovale	TC		<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	TC	
<i>Lithospermum arvense</i>	Grémil des champs	AR		<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	TC	
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie	TC		<i>Plantago scabra</i>	Plantain des sables	AR	
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C		<i>Platanthera chlorantha</i>	Orchis des montagnes	C	
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C		<i>Poa pratensis</i>	Paturin des prés	C	
<i>Matricaria inodora</i>	Matricaire inodore	C		<i>Polygala vulgaris</i>	Polygala commun	C	
<i>Medicago falcata</i>	Luzerne en faucille	R		<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de salomon odorant	AC	
<i>Medicago lupulina</i>	Lupuline	TC		<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseux	TC	
<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine	AC		<i>Polypodium vulgare</i>	Polypode commun	C	

<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée	TC	
<i>Melampyrum arvense</i>	Melampyre des champs	C	
<i>Melilotus officinalis</i>	Mélilot officinal	C	
<i>Monotropa hypopitys</i>	Monotrope sucepin	AC	
<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	C	
<i>Odontites vernus</i>	Odontites rouge	C	
<i>Ononis natrix</i>	Bugrane gluante	AR	
<i>Ononis repens</i>	Bugrane rampante	C	
<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille	C	
<i>Ophrys fuciflora</i>	Ophrys bourdon	AR	
<i>Ophrys sphegodes</i> sp. <i>sphogodes</i>	Ophrys araignée	AC	
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	C	
<i>Orchis simia</i>	Orchis singe	AR	
<i>Orchis ustulata</i>	Orchis brûlée	TR	
<i>Origanum vulgare</i>	Marjolaine	C	
<i>Rosa agrestis</i>	Rosier des haies	AR	
<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens	TC	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosier rouillé	AC	
<i>Rubia perigrina</i>	Garance voyageuse	AR	
<i>Rubus fruticosus</i> (gr.)	Ronce commune (groupe)	TC	
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	TC	
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	C	
<i>Sanguisorba minor</i>	Petite pimprenelle	TC	
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage à trois doigts	C	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	C	
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Peigne de Vénus	R	
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C	
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	AC	
<i>Senecio jacobea</i>	Séneçon de jacobée	TC	
<i>Sedum rupestre</i>	Orpin des rochers	AC	
<i>Seseli montanum</i>	Séseli des montagnes	C	
<i>Sherardia arvensis</i>	Sherardie des champs	C	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Compagnon blanc	TC	
<i>Silene nutans</i>	Silène penchée	AR	
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflée	TC	
<i>Silybum marianum</i>	Chardon marie	NRR	SNA
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C	
<i>Stachys recta</i>	Epiaire dressée	AC	
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux	TC	
<i>Tamus communis</i>	Tamier commun	TC	
<i>Teucrium botrys</i>	Germandrée botryde	AR	
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	C	
<i>Teucrium montanum</i>	Teucrium des montagnes	AR	
<i>Thesium humifusum</i>	Thésion couché	AC	

<i>Potentilla neumanniana</i>	Potentilla printanière	C	
<i>Potentilla reptans</i>	Potentilla rampante	C	
<i>Prunella grandiflora</i>	Brunelle à grande fleurs	AR	
<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée	AR	
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C	
<i>Prunus avium</i>	Merisier	TC	
<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier de Sainte-Lucie	C	
<i>Prunus spinosa</i>	Epine noire	TC	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Anémone pulsatille	AR	
<i>Quercus humilis</i>	Chêne pubescent	C	
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	TC	
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	TC	
<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	TR	SNA
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgatif	C	
<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinier	TC	
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Tabouret perfolié	C	
<i>Thymelea passerina</i>	Passerine	TR	
<i>Thymus praecox</i>	Serpolet couché	C	
<i>Tordylium maximum</i>	Grand tordyle	AR	
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscus	TC	
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés	C	
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	TC	
<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque	R	PR
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée	C	
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	C	
<i>Valerianella locusta</i>	Valériane mâche	C	
<i>Verbascum densifolium</i>	Molène faux bouillon blanc	AC	
<i>Verbascum lychnitis</i>	Molène lychnite	AC	
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	C	
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	TC	
<i>Veronica austriaca</i> sp. <i>teucrium</i>	Véronique germandrée	AR	
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	TC	
<i>Veronica prostrata</i>	Véronique couchée	R	
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne mancienne	TC	
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	TC	
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C	
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée	TC	
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	TC	
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à 4 graines	C	
<i>Vincetoxicum hirsutaria</i>	Dompte-venin	AC	
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	C	
<i>Vitis vinifera</i>	Vigne cultivée	P	
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	C	
<i>Vulpia unilateralis</i>	Vulpie unilatérale	AC	

MALACOLOGIE

Mollusques terrestres et aquatiques cités pour le massif de Fontainebleau et ses environs

Par Philippe VIETTE¹ et Christophe PARISOT²

La malacologie est une discipline qui a été peu abordée ces dernières années dans le bulletin de l'ANVL. Pourtant, les années 50 et 60 furent très prospères dans ce domaine du fait de l'important travail de Yves Quideau³. L'idée de faire un bilan des connaissances de ce groupe est venu grâce à M. Gérard Brusseaux qui a fait parvenir à notre collègue Christian Gibeaux un document intitulé « Notes sur les mollusques du massif de Fontainebleau » publié dans le bulletin 76-4/2000. Ce travail recense les diverses espèces trouvées par Gérard Brusseaux durant une année de prospection sur le massif de Fontainebleau et arrêté au 22 avril 1999.

En réalisant ce bilan, nous espérons motiver des naturalistes à cette discipline ou au moins à les encourager à collecter du matériel pour approvisionner les personnes compétentes telles que M. Brusseaux afin de faire progresser les connaissances en ce domaine. Ce travail prend donc la forme d'une synthèse bibliographique. Grâce à internet nous avons pu confier le manuscrit à Alain Bertrand⁴ qui a eu l'amabilité d'apporter une importante contribution à révision de la nomenclature et de la synonymie. Qu'il soit ici chaleureusement remercié.

Le nom de l'espèce en gras italique est le taxon scientifique en usage actuellement. Lorsque une subdivision de genre est établi, le sous-genre est indiqué entre parenthèse. Suivent, le nom de l'auteur au sens duquel est décrite l'espèce et la date de publication de sa description : lorsque le nom de l'auteur est entre parenthèses, cela signifie que l'espèce a changé de genre. Les synonymes que nous avons pu rencontrer dans les publications citées sont indiqués entre parenthèses. La bibliographie correspondante est livrée à la fin de cet article. Ainsi tout un chacun pourra retrouver facilement la donnée. Nous avons tenté, autant que possible, de résoudre les problèmes de synonymie et d'indiquer les noms selon la nomenclature actuelle. Toutefois, il est possible que subsistent des synonymies compte tenu de l'absence d'ouvrages à jour.

Dans le texte, nous apportons les précisions sur la localité et la date d'observation. Le nom du découvreur (ou identificateur) est indiqué entre parenthèse avec les abréviations suivantes :

YQ : Yves Quideau ; GB : Gérard Brusseaux ; Exc. : excursion

Un numéro également entre parenthèses renvoie à l'article d'où la donnée a été extraite.

L'habitat est mentionné après les mentions taxonomiques et un « > » comme suit :

AD : aquatique dulcaquicole ; T : terrestre suivi de précisions sur l'habitat entre tiret.

? : plusieurs mentions sont précédées ou suivies d'un point d'interrogation qui indique soit un doute sur la localisation du lieu de récolte, soit l'absence de la date de description de l'espèce, de l'auteur ou encore, une incertitude sur la taxonomie de l'espèce.

espèce inconnue : mentionne un taxon cité dans la bibliographie pour lesquels il ne nous a pas été possible de retrouver une place dans la systématique des mollusques actuels ni même une quelconque synonymie.

¹ 2, rue Jules Ferry, 91660 Méréville

² permanent de l'ANVL

³ membre de l'ANVL de 1938 à 1970 dont il fut président en 1956, Yves Quideau a été très actif dans l'association en organisant et en participant à de nombreuses excursions et en relatant ses diverses découvertes malacologiques dans notre bulletin (voir bibliographie) de 1952 à 1966. Décédé en 1970

⁴ laboratoire souterrain, CNRS, 09200 Moulis

Classe : Gastropoda

Sous classe des Prosobranchia

Ordre des Archaeogastropoda

NERITIDAE

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758) (= *Neritina fluviatilis*) : >AD – sur substrat caillouteux - sables de Seine (sans autres précisions, l'auteur prospectant à priori la Seine longeant la forêt de Fontainebleau), (YQ) (3), mars 1952

Dans le Loing au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

Dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans la chute du canal du Palais de Fontainebleau (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Ordre des Mésogastropoda (Architaenioglossa)

CYCLOPHORIDAE

Cochlostoma (Cochlostoma) septemspirale (Razoumowski 1789) (*Pomatias septemspiralis*) : >T – terrain rocheux calcaire variablement ensoleillé - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Cochlostoma (Obscurella) obscurum (Draparnaud 1801) (*Pomatias obscurus*) : >T – terrain rocheux calcaire variablement ensoleillé - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976. [nda : Alain Bertrand nous signale que cette mention est probablement erronée].

VIVIPARIDAE

Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) (= *Paludina vivipara*) : >AD – sur les berges rocheuses des grands fleuves - Dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Les paludines du Loing appartiennent à cette espèce (YQ) (18) juin juillet 1954. [nda : il semble donc qu'il faille reprendre les données de *Paludina fasciata* – *Viviparus contectus* – pour cette espèce]

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Viviparus contectus (Millet 1813) (= *Paludina contecta* = *Paludina fasciata* Müll) : >AD – eaux stagnantes à forte végétation - en Seine dans la région de Fontainebleau (sans autres précisions, l'auteur prospectant à priori la Seine longeant la forêt de Fontainebleau), (YQ) (3) mars 1952

Nombreuses coquilles vides plus ou moins décolorées au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

POMATIASIDAE ou POMATIIDAE

Pomatias elegans (O. F. Müller 1774) (= *Cyclostoma elegans* = *Cyclostoma lutetianum*) : >T – boisements clairs et pelouses calcaires, substrat meuble - En abondance parmi les feuilles mortes près

du Carrefour de la Fourche, dans l'angle formé par les routes de Paris et d'Etampes, en forêt de Fontainebleau (YQ) (8) novembre 1952

Parc du château de Fontainebleau plusieurs années avant (YQ) (8) novembre 1952

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau lors de l'exc. du 15 mars 1953 de l'ANVL) (YQ) (11)

sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

A terre sous les feuilles parmi les herbes le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)

A la base des tufs de la Celle-sur-Seine (YQ) (35) le 10 mars 1963

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Environ de l'Etang de Souppes-sur-Loing (Anne Richer de Forges) (39) lors de la sortie du 1^{er} juillet 1989

Parking du cabaret Masson en avril 1999 (GB) (40)

HYDROBIIDAE

Bythinella viridis (Poirét 1801) : > AD - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

BYTHINIIDAE

Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) (= *Bythinella producta*) : >AD - eaux courantes et stagnantes dans les mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3), mars 1952

Incorporé dans des tubes de Phryganes au bord de l'étang de Courbuisson en forêt de Fontainebleau (YQ) (9') le 8 juin 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A l'état de subfossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans la chute du canal du Palais de Fontainebleau (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Paludestrina stagnalis (Baster 1765) : >AD - petites coquilles recueillies dans un ruisseau près du Loing à Nemours au cours de la sortie du 25 avril 1954 adhérent à un étui de phrygane (YQ) (22)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

[nda : Alain Bertrand nous indique qu'il s'agit d'une espèce des eaux saumâtres fréquentant les estuaires (Germain p.650), sa présence est donc soumise à doute]

HYGROBIIDAE = ACICULIDAE

Zenobiella subrufesceus (Miller 1822) (= *Acicula fusca* Drap. = *Helix fusca* Montg.) : >T - boisements frais, rives ombragés et riche en végétation - forêt de Fontainebleau ? (YQ) (7) août septembre 1952

VALVATIDAE

Valvata piscinalis (O.F. Müller 1774) : > AD - cours d'eau lent - mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3) mars 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Valvata cristata O.F. Müller 1774 : >AD - mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3) mars 1952

Incorporé dans des tubes de Phryganes au bord de l'étang de Courbuisson en forêt de Fontainebleau (YQ) (9') le 8 juin 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Sous classe des Pulmonata

Ordre des Actophila (Basommatophora)

ACROLOXIDAE

Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) (= *Ancylus lacustris*) : >AD - sur les plantes, eaux stagnantes claires - découvert en étudiant des fourreaux de larves de Phryganes. L'auteur ne donne malheureusement pas le lieu de prélèvement de ces fourreaux : Fontainebleau ? (YQ) (5) mai 1952

Incorporé dans des tubes de Phryganes au bord de l'étang de Courbuisson en forêt de Fontainebleau (YQ) (9') le 8 juin 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Dans la mare du Parc aux Bœufs en forêt de Fontainebleau (Naturalistes Parisiens) (21') lors de l'exc. du 17 octobre 1954

Dans la mare du Gros Fouteau (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

CARYCHIIDAE

Carychium minimum O.F. Müller 1774 : >(T) - proche de l'eau, milieux humides et frais - dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

PHYSIDAE

Physa fontinalis (Linnaeus 1758) : > AD - eaux très lentes ou stagnantes, claires et bien végétalisées - dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758) (= *Aplexa muscorum* = *Physa hypnorum*) : >AD - mares - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Physella acuta (Draparnaud 1805) (= *Physa acuta* = *Physa subopaca*) : >AD - eaux très lentes ou stagnantes - vivant à Fontainebleau (Brard) (24) 1815

Coquilles vides dans les sables coquilliers à proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

LYMNAEIDAE

Radix auricularia (Linnaeus 1758) (= *Lymnaea auricularia*) : >AD - eaux stagnantes à végétation dense - dans le bassin du parc du château de Fontainebleau situé près de la grille Adam Salomon (YQ) (3) mars 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

coquilles vides sur la berge du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) (19) et à l'état de subfossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Radix ovata (Draparnaud 1805) (= *Lymnaea limosa* = *Radix limosa* Linnaeus 1758 = *Lymnaea ovata*) :

>AD – eaux stagnantes à végétation dense, mares (par exemple) - dans le bassin du parc du château de Fontainebleau situé près de la grille Adam Salomon (YQ) (3) mars 1952

Dans un lavoir près du Lunain à Lorrez le Bocage (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

forêt de Fontainebleau (Brard) (26) 1815

en quantité dans la chute du canal au parc de Fontainebleau (YQ) (18) juin juillet 1954

coquilles vides sur la berge du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

dans un ruisseau sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Dans la chute du canal du Palais de Fontainebleau (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

- *Radix limosa* var. *ampla* Hartmann 1821: dans le bassin Adam Salomon du parc du château de Fontainebleau (YQ) (18) juin juillet 1954

- *Radix limosa* var. *vulgaris* Pfeiff. : dans le bassin Adam Salomon du parc du château de Fontainebleau (YQ) (18) juin juillet 1954

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

Radix peregra (O.F.Müller 1774) (= *Lymnaea peregra*) : >AD – eaux très lentes ou stagnantes, aussi sur des roches humides ou dans les flaques d'eau - dans le bassin du parc du château de Fontainebleau situé près de la grille Adam Salomon (YQ) (3) mars 1952

coquilles vides sur la berge du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) (= *Lymnaea fragilis*) : >AD – eaux stagnantes ou de faible débit avec végétation dense - dans le bassin du parc [nda : château de Fontainebleau] situé près de la grille Adam Salomon (YQ) (3) mars 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans la mare aux Fées (forêt de Fontainebleau) (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Dans l'étang de Villeron (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Tests desséchés dans un fossé de drainage du gouffre de Larchant (YQ) (35) le 10 mars 1963

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

- *Lymnaea stagnalis* forme *variegata* Hazay : à la mare aux Fées (forêt de Fontainebleau) au début de juillet 1952 et aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (18) v. *Lymnaea glabra* Müll

- *Lymnaea stagnalis* forme *turgida* Menke : à la mare aux Fées (forêt de Fontainebleau) début de juillet 1952 (YQ) (18)

- *Lymnaea stagnalis* forme *locardi* Coutagne : le 11 avril 1954 à Nemours dans le Loing au niveau du Moulin de Doyer (YQ) (18)

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Dans la mare du Parc aux Bœufs en forêt de Fontainebleau (Naturalistes Parisiens) (21') lors de l'exc. du 17 octobre 1954

Stagnicola palustris (O.F. Müller 1774) (= *Lymnaea palustris* = *Lymnaea turriculata*) : >AD – eaux stagnantes à végétation dense - dans le bassin du parc du château de Fontainebleau situé près de la grille Adam Salomon (YQ) (3) mars 1952

Coquilles vides dans les marais voisins au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans le canal d'un moulin désaffecté près de l'étang de Villeron (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Tests desséchés dans un fossé de drainage du gouffre de Larchant (YQ) (35) le 10 mars 1963

Omphiscola glabra (O.F. Müller 1774) (= *Leptolymnaea glabra* = *Lymnaea glabra*) : >AD – fossés, mares, aussi en cours d'assèchement - exemplaire unique trouvé vivant dans la mare aux Fées (forêt de Fontainebleau) au début de juillet 1952 (YQ) (9) mars 1953

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Ces deux données sont remises en doute par l'auteur (16) qui pense les avoir confondu avec des formes juvéniles de *Lymnaea stagnalis* forme *variegata* (18)

Dans la mare de l'Occident (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans la mare du Gros Fouteau (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans les mares aux Ligneurs et la mare à Piat (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans la végétation des étangs et mares temporaires du bois des Rochettes, parcelle 814 en juillet 1998 (GB) (40)

Galba truncatula (O.F. Müller 1774) (= *Lymnaea truncata*) : >AD – fossés, lacs, étangs, quitte parfois l'eau pour le feuillage de la végétation riveraine - Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Un spécimen jeune de 3mm de long trouvé vivant dans le Loing (forêt de Fontainebleau ?) (YQ) (16) février 1954

Dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

Dans la mare du Gros Fouteau (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Myxas glutinosa (O.F. Müller 1774) (= *Amphipeplea glutinosa*) : >AD – mares et cours d'eau lent, végétation dense - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

PLANORBIDAE

Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) (= *Coretus corneus* = *Planorbis corneus*) : >AD – mares et eaux lentes riches en végétation - dans les mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3), mars 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Au vieux moulin de Bagneaux, dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

A Grez-sur-Loing (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Dans le marais de Roncevaux à Malesherbes, dans le premier lavoir sur un ru affluent de l'Essonne (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959

Tests desséchés dans un fossé de drainage du gouffre de Larchant (YQ) (35) le 10 mars 1963
 Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) (= *Planorbis umbilicatus* Müll = *Planorbis arnouldi* Germain) :
 >AD – eaux stagnantes à végétation dense : mares vaseuses, fossés, marécages ; supporte l'assèchement - dans les mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3), mars 1952
 Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')
 Au vieux moulin de Bagneaux, dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)
 A l'état de subfossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')
 Dans la mare aux Fées (forêt de Fontainebleau) (YQ) (18) juin juillet 1954
 A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans la mare aux Fées (forêt de Fontainebleau) (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
 Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957
 Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Planorbis carinatus (O.F. Müller 1774) : >AD – cours d'eau lents et mares - dans les mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3), mars 1952
 dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)
 Dans le canal d'un moulin désaffecté près de l'étang de Villeron (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
 Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Anisus vortex (Linnaeus 1758) (= *Spiralina vortex*) : >AD – sur les végétaux, eaux lentes et stagnantes - dans les sédiments du Loing aux environs de Nemours (YQ) (16) lors de l'exc. du 27 avril 1952
 Dans la chute du canal du Palais de Fontainebleau (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957
 Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Anisus leucostoma (= Millet 1813) (= *Planorbis rotundatus* Poiret) : >AD – petits plans d'eau ; fossés, marécages... - aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Gyraulus albus (O.F. Müller 1774) (= *Planorbis albus*) : >AD – eaux très lentes et stagnantes - dans les mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3), mars 1952
 Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')
 A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus 1758) (= *Planorbis cristatus*) : >AD – sur les végétaux, dans les lacs, étangs, mares... - dans les mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (3), mars 1952

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) (= *Planorbis complanatus* = *Hippeutis fontanus* Lightf = *Planorbis fontanus* Lightf) : >AD – uniquement dans les eaux non courantes, substrat argileux - Incorporé dans des tubes de Phryganes au bord de l'étang de Courbuisson en forêt de Fontainebleau (YQ) (9') le 8 juin 1952
 Assez rare ; étang de Courbuisson (forêt de Fontainebleau) (YQ) (9) mars 1953
 Dans la mare du Parc aux Bœufs en forêt de Fontainebleau (Naturalistes Parisiens) (21') lors de l'exc. du 17 octobre 1954
 Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758) (= *Planorbis contortus*) : >AD – eaux lentes et étangs riches en végétation, aussi zone calme des méandres des fleuves – plusieurs exemplaires vides et décolorés ont été trouvés au bord du Loing (YQ) (16) février 1954

Au vieux moulin de Bagneaux, dans le Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans un bassin source sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Ancylus fluviatilis O.F. Müller 1774 (= *simplex* Buc'hoz) (= *Ancylastrum fluviatile*) : >AD – eaux courantes, se fixe sur les rochers – un seul individu trouvé vivant dans un bassin près de la chute du Grand Canal du Palais de Fontainebleau (YQ) (9) mars 1953

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

En sédiment sur la berge du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans un ruisseau sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Dans la chute du canal du Palais de Fontainebleau (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Segmentina nitida (O.F. Müller 1774) : >AD – fond vaseux des mares, végétation aquatique – dans la mare de l'Occident (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans la mare du Gros Fouteau (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Bulininae

Bulinus contortus (Michaud 1829) : cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976 [nda : il s'agit d'une espèce Méditerranéenne et par conséquent soumise à doute (Alain Bertrand comm. Pers.)]

Ordre des Stylommatophora

COCHLICOPIDAE

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller 1774) (= *Zua subcylindrica* (= *lubrica* Drap.) L.) : >T – zones modérément humides de types variés – découvert en étudiant des fourreaux de larves de Phryganes. L'auteur ne donne malheureusement pas le lieu de prélèvement de ces fourreaux : Fontainebleau ? (YQ) (5) mai 1952

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)

Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

LAURIIDAE

Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa 1778) (= *Pupa cylindracea* Da Costa = *Pupa umbilicata* Draparnaud) : >T – bois, prairies sauf milieux très secs – sous les mousses et lichens des rochers près de Chaintréauville à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)
espèce répandue partout dans la mousse (YQ) (8) novembre 1952

ORCULIDAE

Spyradium dololium (Bruguière 1792) (= *Orcula doliolium*) : >T – dans la litière, milieux frais et ombragés, calciphile : bois, rochers... – une coquille vide trouvée dans le parc du Château de Fontainebleau (YQ) (16)

CHONDRINIDAE

Granaria frumentum (Draparnaud 1801) (= *Pupa frumentum*) : >T - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976. [nda : Alain Bertrand nous signale que cette donnée est erronée puisqu'il s'agit d'une espèce des Alpes].

Abida secale (Draparnaud 1801) (= *Pupa secale*) : >T - milieux ouverts, pelouses sèches, boisements clairs, calciphile - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Chondrina avenacea (Bruguière 1792) (= *Pupa avena*) : >T - milieux ouverts sur substrat calcaire : pelouses, rochers - forêt de Fontainebleau (Brard) (26) 1815

PUPILLIDAE

Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus 1758) (= *Pupa muscorum* O.F. Müller = *Isthmia muscorum* = *Pupa cylindracea* Da Costa) : >T - places ensoleillées sur substrat calcaires : murs, rochers, pelouses ouvertes - dans le Parc du Château, exceptionnellement dans l'eau (YQ) (8) novembre 1952 au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau lors de l'exc. du 15 mars 1953 de l'ANVL) (YQ) (11) près du Marchais Muet aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953 Le Carrosse du Haut Mont (forêt de Fontainebleau) (Pierre Doignon) (13) le 3 mai 1953 et (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Lors de l'exc. du 29 janvier 1956 à la Roche Eponge (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Lors de l'exc. du 25 mars 1956 au Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

- *Pupilla (Pupilla) muscorum* forme *simplex* Locard : Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (18) mars 1954

Pupilla (Pupilla) bigranata Rossmäler 1839 (= *Pupilla (Pupilla) muscorum* forme *bigranata*) : >T - zones très sèches et ensoleillées sur substrat calcaire : pelouses xérophiles, graviers, rochers - Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (18) mars 1954

Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer 1820) : >T - Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (17) mars 1954

PYRAMIDULIDAE

Pyramidula rupestris (Draparnaud 1801) : >T - rochers calcaires, milieux secs et ensoleillés - sur les poudingues à ciment calcaire de Bagneaux sur Loing où il forme des colonies nombreuses parmi les mousses calcicoles (YQ) (22) février 1955

VALLONIIDAE

Valloniinae

Vallonia costata (O.F. Müller 1774) (= *Helix costata* L.) : >T - milieux ouverts sur substrat calcaire, murs, rochers, pelouses xérophiles, plus rarement dans les bois clairs - dans la mousse sur les poudingues près de Bagneaux lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Une coquille vide trouvée au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) (YQ) (16) février 1954

A l'angle du boulevard Circulaire et de la route Brossard de Corbigny qui conduit au stade de la Faisanderie (YQ) (28) avril 1956

Vallonia pulchella (O.F. Müller 1774) (= *Helix pulchella* L.) : >T - emplacements ouverts sur substrat calcaire, milieux mésophile à modérément humide - sous les mousses et lichens des rochers près de Chaintreauville à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6) au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau), sous les mousses des creux à l'état de coquilles vides (Pierre Doignon et YQ) (12) le 1^{er} mai 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Acanthinulinae

Acanthinula aculeata (O.F. Müller 1774) (= *Helix aculeata*) : >T – dans la litière, bois, haies, sous les bois morts, rarement dans les milieux plus ouverts - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

VERTIGINIDAE

Vertigininae

Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud 1801) : >T – zones humides - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud 1801) : >T – pelouses calcicoles sèches - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

ENIDAE

Chondrula (Chondrula) tridens (O.F. Müller 1774) (= *Chondrius tridens*) : >T – pelouses calcicoles xérophiles - en quantité route de Montigny-sur-Loing à Moret dans la région traversée par l'aqueduc de la Vanne sur le talus de chemin de fer (YQ) (27) janvier 1956
Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Jaminia (Jaminia) quadridens (O.F. Müller 1774) (= *Chondrius quadridens*) : >T – emplacement ensoleillé et sec sur substrat calcaire : rochers et graviers - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Merdigera obscura (O.F. Müller 1774) (= *Ena obscura* = *Buliminus obscurus*) : >T – bois litières, murs et rochers ombragés - observé dans le Parc du château de Fontainebleau date ? (YQ) (28)
Lors de l'exc. du 25 mars 1956 au Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

CLAUSILIIDAE

Allopiinae

Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu 1803) (= *Clausilia laminata*) : >T – bois et milieux ombragés, litière - plusieurs échantillons dans les fentes d'un tronc pourri, spongieux et gorgé d'eau, abattu près du Loing en rive gauche entre le Moulin de Doyer et le Pont de Bagneaux à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Espèce très répandue en forêt, soit dans les fentes moussues des rochers, soit dans les souches (YQ) (8) novembre 1952

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Au pied des murs ruinés du vieux moulin de Bagneaux, sous les hautes herbes, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Au bas de murailles sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Charpentiera itala (Martens 1824) (= *Clausilia punctata*) : >T – rochers et vieux murs, boisement (feuillus) - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976 [nda : cette espèce est soumise à doute, Alain Bertrand nous la signalant comme une espèce du sud des Alpes]

Clausiliinae

Macrogastra ventricosa (Draparnaud 1807) (= *Clausilia ventricosa*) : >T – bois, dans la litière, la mousse - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Macrogastra plicatula (Draparnaud 1801) (= *Clausilia plicatula*) : >T – bois, rochers frais et ombragés - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Clausilia bidentata (Ström 1765) (= *Clausilia obtusa* Pfeif. = *Clausilia nigricans* Pultney) : >T – milieux mésophiles : bois rochers, murs... - sous les mousses et lichens des rochers près de Chaintréauville à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

espèce partout abondante en forêt de Fontainebleau, notamment dans les vieilles souches où elle se tient de préférence dans les parties hachées et imbibées d'eau. Trouvée également vers la Fourche dans les coquilles vides de Cyclostomes ainsi que sous la mousse des rochers (YQ) (8) novembre 1952

Au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)

Sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon) (13) le 3 mai 1953

Et (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

Lors de l'exc. du 29 janvier 1956 à la Roche Eponge (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Lors de l'exc. du 25 mars 1956 au Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Clausilia rugosa parvula (A. Férussac 1807) (= *Clausilia parvula* Stud.) : >T – milieux mésophiles : bois, rochers, vieux murs, calciphile - trouvé derrière l'abattoir de Fontainebleau, sur une vieille souche (YQ) (10) 1951

Parcelle 68 en avril 1999(GB) (40)

Baleinae

Balea perversa (Linnaeus 1758) : >T – emplacement sec et ensoleillé sur rochers, vieux murs - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

SUCCINEIDAE

Succineinae

Succinea (Succinella) oblonga Draparnaud 1801 : >T – zones humides, sur la végétation - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Succinea (Succinea) putris (Linnaeus 1758) (= *Succinea acrambleia* ?) : >T – zones humides, sur la végétation riveraines - en grande quantité sur les iris et autres plantes d'eau des mares riveraines du Loing en rive gauche entre le Moulin de Doyer et le Pont de Bagneaux à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6) ;

Sur les herbes au dessus de l'eau ; fossé inondé dans le Parc du château de Fontainebleau, près de la grille Adam Salomon (YQ) (8) novembre 1952

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Dans le Loing entre Montigny et Grez (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
 Dans le marais de Roncevaux à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959
 Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966
 Etangs de Souppes-sur-Loing (Anne Richer de Forges) (39) lors de la sortie du 1^{er} juillet 1989

Oxyloma elegans (Risso 1826) (= *Succinea pfeifferi* = *Succinea virescens* ? = *Succinea debilis* ? = *Succinea longiscapa* ?) : >T – zones humides : marais, rives d'étang, berges ensoleillées... - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Catinellinae

Quickella arenaria (Bouchard-Chantreaux 1837) (= *Succinea arenaria*) : >T – végétation éparsée des zones humides, emplacement ensoleillé - forêt de Fontainebleau ? (Jean Vivien) (9) mars 1953
 autour de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

FERUSSACIIDAE

Cecilioides (Ceciliodes) acicula (O.F. Müller 1774) (= *Coecilioides acicula*) : >T – endobionte (vit dans le substrat), litière, crevasse de rochers, surtout calcaire - dans le parc du Château ; dans le déversoir du Bassin Adam Salomon, exceptionnellement dans l'eau (YQ) (8) novembre 1952

TESTACELLIDAE

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801 (= *Testacella europaea* de Roissy) : >T – parcs et jardins, prairies - Thomery (Ernest David) (1),
 Bourdon (Saint-Pierre-les-Nemours) en juillet 1926 dans la partie sombre et très humide du parc de Jean Lasnier (Jean Dalmon) (1),
 Montigny-sur-Loing, jardin de la maison de Jacques Dalmon (Jacques Dalmon) juin 1928 (1)
 Mur de soutènement de la voie ferrée à Montigny-sur-Loing (Jean Vivien) (38) le 25 septembre 1981

PUNCTIDAE

Punctinae

Punctum pygmaeum (Draparnaud 1801) (= *Helix pygmaea*) : >T – milieux divers modérément humides à végétation riche, dans la litière (feuillus) - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

DISCIDAE

Discus rotundatus (O.F. Müller 1774) (= *Goniodiscus rotundatus* = *Helix rotundata* = *Pyramidata rotundata*) : >T – bois, dans la litière ou dans un substrat meuble, plus ou moins modérément humide - forêt de Fontainebleau ? (YQ) (7) août septembre 1952
 Forêt de Fontainebleau ? (YQ) (8) novembre 1952
 Au Mont Ussy-Calvaire (forêt de Fontainebleau) (YQ) (9'') lors de l'exc. du 15 février 1953
 Au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau lors de l'exc. du 15 mars 1953 de l'ANVL) (YQ) (11)
 Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon) (13) le 3 mai 1953
 Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953
 Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')
 Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)
 A l'état de sub-fossile au Moulin de Doyer, près de Nemours, en bordure de Loing (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19')
 Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
 Lors de l'exc. du 29 janvier 1956 à la Roche Eponge (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)
 Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
 Carrière de Dordives (Anne Richer de Forges) (39) lors de la sortie du 1^{er} juillet 1989
 Parcelle 630, carrefour des grands Feuillards, parcelle 141, champs de manœuvre, parcelle 68 (forêt de Fontainebleau), parcelle 97, la Feuillardière (massif des Trois Pignons à Arbonne la Forêt) en février 1999 (GB) (40)

GASTRODONTIDAE

Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O.F. Müller 1774) (= *Hyalinea nitida*) : >T - à la sortie de Fontainebleau près de la route de Melun (YQ) (8) novembre 1952
Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

EUCONULIDAE

Euconulus (Euconulus) fulvus (O.F. Müller 1774) (= *Hyalinea fulvus*) : >T - bois, prairies, marais, milieux frais - à la sortie de Fontainebleau près de la route de Melun (YQ) (8) novembre 1952
Première mention de cette espèce réputée assez rare, au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)
Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

VITRINIDAE

Vitrininae

Vitrina (Vitrina) pellucida O.F. Müller 1774 : >T - milieux modérément humides (tous types) - au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau), sous les mousses des creux à l'état de coquilles vides (Pierre Doignon et YQ) (12) le 1^{er} mai 1953
Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon) (13) le 3 mai 1953
Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953
Carrière de Dordives (Anne Richer de Forges) (39) lors de la sortie du 1^{er} juillet 1989

Phenacolimacinae

Phenacolimax major (Férussac 1807) (= *Vitrina major*) : >T - emplacement humide des bois, prairies - dessiné de Fontainebleau en 1931 dans la Faune de France de L. Germain
Parcelle 141, champs de manœuvres en octobre 1998 (GB) (40)
Parcelle 68 en avril 1999 (GB) (40)

Eucobresia diaphana (Draparnaud 1801) (= *Vitrina diaphana*) : >T - emplacement modérément humide des bois, prairie (espèce plutôt montagnarde) - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976. [nda : Alain Bertrand nous indique que cette donnée est probablement erronée]

ZONITIDAE

Vitreae

Vitrea (Crystallus) crystallina (O.F. Müller 1774) (= *Hyalina cristallina*) : >T - divers plutôt humides : marais par exemple - à la sortie de Fontainebleau près de la route de Melun (YQ) (8) novembre 1952
Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
A l'angle du boulevard Circulaire et de la route Brossard de Corbigny qui conduit au stade de la Faisanderie (YQ) (28) avril 1956

Zonitinae

Aegopinella nitidula (Draparnaud 1805) (= *Hyalinea nitidula*) : >T - emplacement modérément humide : bois, lisière, prairies - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Aegopinella nitens (Michaud 1831) (= *Hyalinea nitens*) : >T - emplacement modérément humide : bois, lisière marais, plutôt en montagne - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Perpolita hammonis (Ström 1765) (= *Hyalinea radiatula*) : >T - divers, humide à modérément sec dans divers milieux - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Oxychilinae

Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. Müller 1774) (= *Hyalinea cellaria*) : >T – emplacement frais et ouvert de tous types : jardins, roches - à la sortie de Fontainebleau près de la route de Melun (YQ) (8) novembre 1952

Au Mont Ussy-Calvaire, à la Fontaine Isabelle, (forêt de Fontainebleau) (YQ) (9'') lors de l'exc. du 15 février 1953

Au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau), sous les mousses des creux à l'état de coquilles vides (Pierre Doignon et YQ) (12) le 1^{er} mai 1953

Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck 1873) (= *Oxychilus lucidus* Draparnaud = *Hyalinea lucida* = *Hyalinea farinesiana* = *Hyalinea septentrionalis* = *Hyalinea intermissa*) : >T – emplacement frais divers : jardins, bois, rochers... - à la sortie de Fontainebleau près de la route de Melun (YQ) (8) novembre 1952

Existe partout à Fontainebleau parmi les détritux végétaux (YQ) (22) février 1955

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Oxychilus helveticus (Blum 1881) (= *Hyalinia helveticus* = *Hyalinia subglabra*) : >T - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976 [nda : il s'agit probablement d'une erreur]

MILACIDAE

Milax (Milax) gagates (Draparnaud 1801) : >T – cultures et jardins, quelquefois dans les bois - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

LIMACIDAE

Limax (Limax) maximus Linnaeus 1758 (= *Limax cinereus* Müller = *Limax cellarius* d'Arg.) : >T – bois, parcs et jardins, milieux frais - en forêt de Fontainebleau (Naturalistes Parisiens) (21') lors de l'exc. du 17 octobre 1954

Lors de l'exc. du 29 janvier 1956 à la Roche Eponge (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Limax (Limax) cinereoniger Wolf 1803 : >T – bois, sous les bois morts... - parcelle 68, (forêt de Fontainebleau) sous futaie de pins en avril 1999 (GB) (40)

Limacus flavus (Linnaeus 1758) (= *Limax flavus* = *Limax variegatus*) : >T – cultures, jardins, bords de route - un exemplaire provenant de Valence en Brie (YQ) (28) avril 1956

Lehmannia marginata (O.F. Müller 1774) (= *Limax marginatus* = *Limax arborum* Bouch.) : >T – bois, sous les arbres morts ; plus rarement dans les milieux ouverts : vieux murs (humides) - sur bois au Bas Bréau (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 27 septembre 1953 (YQ) (15)

Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956

AGRIOLIMACIDAE

Deroceras (Agriolimax) agreste (Linnaeus 1758) : >T – pâturages, prairies de montagne, espèces montagnardes - sur la terre humide dans un jardin particulier (Fontainebleau ?) en octobre 1953 (YQ) (15)

ARIONIDAE

Arion (Arion) rufus/ater (complexe) (Linnaeus 1758) (= *Arion empiricorum* Ferussac = *Arion aggericola* Mabilley) : >T – terrain acide divers ; jardins, prairies, bois... - aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Forme très commune à Fontainebleau, observée notamment sur des débris végétaux, sur golmotte [!] au Bas Bréau (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 27 septembre 1953 (YQ) (15) dans l'herbe humide au bord du Loing

Plusieurs exemplaires sur *Russula fellea* près du laboratoire de biologie végétale en octobre 1953 (YQ) (15)

A proximité de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955 [donnée d'*Arion rufus* et d'*Arion aggericola* pour la même date!!!]

Lors de l'exc. du 29 janvier 1956 à la Roche Eponge (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956 [donnée d'*Arion rufus* et d'*Arion ater* pour la même date!!!]

Lors de la sortie du 22 mars 1959 au Long Rocher et à la Vallée Jauberton (forêt de Fontainebleau) (YQ) (33) [donnée d'*Arion rufus* et d'*Arion aggericola* pour la même date!!!]

Aux Buttes de la Justice et de Trézan à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud 1805) : >T – bois et prairies, jardins, etc... très ubiquiste - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Parcelle 68 (forêt de Fontainebleau) sous futaie de pins en avril 1999 (GB) (40)

Arion (Kobeltia) hortensis (Férussac 1819) : >T - trouvé dans un jardin particulier (Fontainebleau ?) en octobre 1953 (YQ) (15)

Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956

BRADYBAENIDAE

Fruticicola fruticum (O.F. Müller 1774) (= *Eulota fruticum* = *Helix fruticum*) : >T – milieux humides divers, relativement arboricole - forêt de Fontainebleau (Brard) (26) 1815

une coquille vide trouvée au stade de la faisanderie (Fontainebleau) (YQ) (16) février 1954

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Dans l'herbe de la maison du garde d'un moulin désaffecté près de l'étang de Villeron (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

A la Celle-sur-Seine (YQ) (29) lors de l'exc. du 27 mai 1956

HYGROMIIDAE

Helicodontinae

Helicodonta obvoluta (O.F. Müller 1774) (= *Helix obvoluta*) : >T – bois et lisières sur substrat calcaire - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Monachinae

Euomphalia strigella (Draparnaud 1801) : >T – bois clairs, lisières, sols caillouteux, emplacement modérément ensoleillé - dans l'île de Samois (YQ) (27) janvier 1956

Lors de l'exc. du 25 mars 1956 au Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

A l'angle du boulevard Circulaire et de la route Brossard de Corbigny qui conduit au stade de la Faisanderie (YQ) (28) avril 1956

Parcelle 240 (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)

Parcelle 141 (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)

Parcelle 95, la Feuillardièrre (massif des Trois Pignons) à Arbonne-la-Forêt en avril 1999 (GB) (40)

Cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) avec la mention Locard 1894 sans autre précision 1976

Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller 1774) (= *Theba cartusiana* = *Helix cartusiana*) : > T – divers, plutôt prairies et bord de route - forêt de Fontainebleau ? (YQ) (7) août septembre 1952
sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953
Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')
Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)
A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
Parcelle 141 champ de manœuvre (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998(GB) (40)
Parcelle 131 (forêt de Fontainebleau) en juillet 1998 (GB) (40)

Geomitrinae

Trochoidea pyramidata (Draparnaud 1805) (= *Helix pyramidata*) : >T - dans le sable (forêt de Fontainebleau ?) (YQ) (7) août septembre 1952
près du Marchais Muet et sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953
[nda : ces données, selon Alain Bertrand sont probablement erronées puisqu'il s'agit d'une espèce Méditerranéenne]

Hygromiinae

Trichia (Trichia) hispida Linnaeus 1758) (= *Fruticicola hispida* = *Fruticicola latiscentis* = *Fruticicola microgyra*) : >T – partout sauf emplacement très sec - à proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
Fruticulosa [nda : probablement *Fruticicola*] *latiscentis* est citée par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) avec la mention Locard 1888 sans autre précision 1976

Trichia (Trichia) sericea (Draparnaud 1801) (*Helix sericea* = *Fruticicola sericea* var *plebeia* = *Helix plebeja* = *Fruticicola urbana* = *Fruticicola saricina* = *Fruticicola badiella*) : >T – partout sauf emplacement très sec - forêt de Fontainebleau ? (YQ) (7) août septembre 1952 [nda : sont citées à cette date *Helix plebeja* et *Helix sericea* que l'auteur distingue par l'absence d'une bande blanchâtre. Aujourd'hui ces deux espèces n'en font plus qu'une, *Trichia (Trichia) plebeia* étant réservé à un taxon du Jura (Alain Bertrand, comm. Pers.)]
Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')
Un exemplaire en forêt de Fontainebleau (YQ) (28) avril 1956
Cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) avec la mention Locard 1894 sans autre précision 1976

Candidula unifasciata (Poiret 1801) (= *Helicella unifasciata* = *Helix spirilla* West = *Helicella rugosiuscula* = *Helix crema* Bourg) : >T – habitat sec, ouvert, sur substrat rocheux ou graveleux - cité de Fontainebleau (Cherbonnier, coll. Locard) (26) [nda : citée comme deux espèces distinctes dans la collection et dans (26) en tant que *Helicella rugosiuscula* (pour *Helix spirilla*) et *Helicella unifasciata* (pour *Helix crema*), or l'actuelle sous espèce *Candidula unifasciata* ssp. *rugosiuscula* (Michaud 1831) est du sud de la France]
En assez grande abondance à la Solle entre le champs de courses et la route de Melun (YQ) (27) janvier 1956

Candidula intersecta (Poiret 1801) : >T – emplacement sec et ouvert : pelouses calcicoles par exemple - parcelle 141, champ de manœuvres (forêt de Fontainebleau) en septembre 1998 (GB) (40)
Arbonne-la-Forêt, massif des Trois Pignons, la Feuillardière, parcelle 97 en avril 1999 (GB) (40)

Candidula gigaxii (Pfeiffer 1850) (= *Helix heripensis* Mabilie = *Candidula groboni* = *Candidula thuillieri*) : >T – milieux secs sur substrat calcaire - forêt de Fontainebleau ? (YQ) (7) août septembre 1952

Cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) avec la mention Locard 1890 sans autre précision 1976 sous deux synonymes

Arbonne-la-Forêt, massif des Trois Pignons, La Feuillardière, parcelle 95 en mai 1999 (GB) (40)

Helicella itala (Linnaeus 1758) (*Helicella ericetorum* O.F. Müller = *Helix ericetorum*) : >T – milieux ensoleillés et secs, pelouses calcicoles - marais de Larchant le vendredi 4 mai 1951 (P. Doignon, A. Lefebvre, J. Lasnier et L. Boyer) (41)

Parc du château de Fontainebleau (YQ) (7) août septembre 1952

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)

sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Dans les poudingues près de Bagneaux lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Lors de l'exc. du 25 mars 1956 au Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Sur les coteaux d'Episy (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)

A la base des tufs de la Celle-sur-Seine (YQ) (35) le 10 mars 1963

parcelle 141, champ de manoeuvres (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)

Parcelle 131 (forêt de Fontainebleau) en juillet 1998 (GB) (40)

Le Cabaret Masson (forêt de Fontainebleau) en août 1998 trouvé par Christian Gibeaux (GB) (40)

Plaine de Chanfroy (massif des Trois Pignons) à Arbonne-la-Forêt le 13 octobre 1998 trouvé par Christian Gibeaux (GB) (40)

La Feuillardière (massif des Trois Pignons) à Arbonne-la-Forêt en octobre 1998 (GB) (40)

Parcelle 97 (forêt de Fontainebleau) en avril 1999 (GB) (40)

Xerosecta explanata (O.F. Müller 1774) (= *Helix explanata*) : >T - trouvé dans le sable (forêt de Fontainebleau ?) (YQ) (7) août septembre 1952 [nda : selon Alain Bertrand, il s'agit probablement d'une erreur, cette espèce étant Méditerranéenne]

Cernuella (Cernuella) virgata (da Costa 1778) (= *Cernuella maritima* Draparnaud = *Cernuella variabilis* = *Helix variabilis*) : >T – habitat modérément sec, calcicole, milieux ouverts - 3 pièces à ornementation varié dans l'herbe humide à proximité du Loing en rive gauche entre le Moulin de Doyer et le Pont de Bagneaux à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)

près du Marchais Muet et sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Dans les poudingues près de Bagneaux lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Observée en quantité à la Solle (forêt de Fontainebleau) entre le champ de courses et la route nationale 5 (YQ) (22) février 1955

Trouvé à Samois dans l'île aux Barbiers (YQ) (27) janvier 1956

Parcelle 240 (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)

Hygromia limbata (Draparnaud 1805) (= *Helix limbata*) : >T – bois, lisières, prairies fraîches - aux alentours de la Fourche en forêt de Fontainebleau (YQ) (7) août septembre 1952

Hygromia cinctella (Draparnaud 1801) (= *Helix rufescens* Penn.) : >T – bois, lisières - jardin particulier (Fontainebleau ?) (YQ) (7) août septembre 1952

HELICIDAE

Ariantinae

Arianta arbustorum (Linnaeus 1758) (= *Helix arbustorum*) : >T – zones fraîches des milieux secs à substrat bien drainé - forêt de Fontainebleau (Brard) (26) 1815

trouvé dans les marais de Montigny-sur-Loing par A. Laville en 1912 (2) Feuilles des Jeunes Naturalistes tome XLII [1912] p.155 ;

Nombreuses pièces dans l'herbe humide à proximité du Loing en rive gauche entre le Moulin de Doyer et le Pont de Bagneaux à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Dans le Loing entre Montigny et Grez (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Sur les bords de la Seine à Valvins (YQ) (34) le 18 janvier 1959

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Helicigona lapicida (Linnaeus 1758) (= *Helix lapicida*) : >T – dans les fissures de rochers (blocs de grès), bois et vieux murs - forêt de Fontainebleau (Brard) (26) 1815

sur le bord de la voie ferrée au niveau du laboratoire de biologie végétale lors de l'exc. du 8 juin 1952, Fontainebleau (YQ) (7)

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau) lors de l'exc. du 15 mars 1953 (YQ) (11)

nombreuses coquilles vides sur les pentes, sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon) (13) le 3 mai 1953

Le Carrosse du Haut Mont en forêt de Fontainebleau (Pierre Doignon et YQ) (13) le 25 mai 1953

Dans les poudingues près de Bagneaux lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Lors de l'exc. du 29 janvier 1956 à la Roche Eponge (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Lors de l'exc. du 25 mars 1956 au Cuvier Chatillon (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28)

Lors de la sortie du 22 mars 1959 au Fort de Marlotte, le long du CD104 à Marlotte et à la Vallée Jauberton (forêt de Fontainebleau) (YQ) (33)

La Tillaie (forêt de Fontainebleau) en août 1998 trouvé par Christian Gibeaux (GB) (40)

Parcelle 68 (forêt de Fontainebleau) en avril 1999 (GB) (40)

Helicinae

Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus 1758) (= *Helix nemoralis*) : >T – habitats variés : bois, prairies, bord de route, jardins, etc... - marais de Larchant le vendredi 4 mai 1951 (P. Doignon, A. Lefebvre, J. Lasnier et L. Boyer) (41)

2 coquilles vides fasciées différemment dans l'herbe humide à proximité du Loing en rive gauche entre le Moulin de Doyer et le Pont de Bagneaux à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

près du cimetière de Fontainebleau, près du carrefour de la Fourche en forêt de Fontainebleau, (YQ) (7) août septembre 1952

au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau lors de l'exc. du 15 mars 1953 de l'ANVL) (YQ) (11)

près du Marchais Muet et sur les poudingues aux environs de Nemours (YQ) (12') lors de l'exc. du 19 avril 1953

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A la Celle-sur-Seine (YQ) (29) lors de l'exc. du 27 mai 1956

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

- Carrière de Dordives (Anne Richer de Forges) (39) lors de la sortie du 1^{er} juillet 1989
 Parcelle 141, champ de manœuvre (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)
 Parcelle 131 (forêt de Fontainebleau) en juillet 1998 (GB) (40)
 Le Cabaret Masson (forêt de Fontainebleau) en septembre 1998 et sur le parking en avril 1999 (GB) (40)
 Le Rocher de la Salamandre (forêt de Fontainebleau), parcelle 134 en avril 1999 (GB) (40)
 Parcelle 240, en face du Cabaret Masson (forêt de Fontainebleau) en avril 1999 (GB) (40)
 Parcelle 68, sous futaie de pin, (forêt de Fontainebleau) en avril 1999 (GB) (40)
 Parcelles 95 et 97, la Feuillardière (massif des Trois Pignons) à Arbonne-la-Forêt (GB) (40)
- *Cepaea nemoralis* var. *polia* MT : autour de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955
 Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
 Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956
 Dans le Loing entre Montigny et Grez (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
 - *Cepaea nemoralis* var. *cuvieria* MT. : autour de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955
 A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
 Aux Buttes de la Justice et de Trézan à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959
 - *Cepaea nemoralis* var. *bignetia* MT. : autour de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955
 A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
 Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)
 Aux Buttes de la Justice et de Trézan à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959
 - *Cepaea nemoralis* var. *castanea* : A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956
 Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)
 - *Cepaea nemoralis* var. *castanea* forme *minor* : autour de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955
 Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
 - *Cepaea nemoralis* var. *argenvillia* MT.: A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956
 - *Cepaea nemoralis* var. *libellula* Russo.: A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
 Aux Buttes de la Justice et de Trézan à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959
 - *Cepaea nemoralis* var. *olivia* MT.: A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
 Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956
 Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)

- *Cepaea nemoralis* var. *quinquefasciata* MT.: A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956
Dans le Loing entre Montigny et Grez (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)
Aux Buttes de la Justice et de Trézan à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959
- *Cepaea nemoralis* var. *draparnaudia* MT.: A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
- *Cepaea nemoralis* var. *reaumuria* : A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
Aux Buttes de la Justice et de Trézan à Malesherbes (YQ) (33) lors de la sortie du 18 mai 1959
- *Cepaea nemoralis* var. *dugesia* : A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
- *Cepaea nemoralis* var. *ducharsia* : A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
- *Cepaea nemoralis* var. *costasia* : Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
- *Cepaea nemoralis* var. *poiretia* : Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
- *Cepaea nemoralis* var. *gabillotia* Loc. : un exemplaire au bord du Loing à Nemours (YQ) (27) janvier 1956
- *Cepaea nemoralis* var. *dillwynia* : un exemplaire trouvé à Valence en Brie (YQ) (27) janvier 1956

Cepaea (Cepaea) hortensis (O.F. Müller 1774) (= *Helix hortensis*) : >T – habitats variés, sensiblement plus humides que *C. nemoralis* - carrefour de la fourche en forêt de Fontainebleau (YQ) (7) août septembre 1952

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')
Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)
Ferme du Boulay (Anne Richer de Forges) (39) lors de la sortie du 1^{er} juillet 1989
Parcelle 141, champs de manœuvres (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)
Parcelle 134, le Rocher de la Salamandre en avril 1999 (GB) (40)
Parcelles 95 et 97, la Feuillardière (massif des Trois Pignons) à Arbonne-la-Forêt en avril 1999 (GB) (40)

- *Cepaea hortensis* var. *lutea* MT : une colonie de cette forme a été trouvée sur la végétation qui recouvre à droite les murs des arènes de Chennevière à Montbouy (Loiret). Tous les individus trouvés à Fontainebleau à ce jour appartiennent à cette forme (YQ) (22) février 1955
A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955
Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
Dans le Loing entre Montigny et Grez (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956
- *Cepaea hortensis* var. *barnesia* MT : dans un jardin particulier (Fontainebleau ?) (YQ) (22) février 1955
Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955
Dans la plaine boisée qui continue au nord des rochers du Mont Ussy (forêt de Fontainebleau) (YQ) (28) le 25 mars 1956
- *Cepaea hortensis* var. *quinquevittata* MT. : un exemplaire au pied du viaduc de Changis à Avon (YQ) (27) janvier 1956
- *Cepaea hortensis* var. *albifasciata* Tayl. : Valence en Brie (YQ) (28) avril 1956
- *Cepaea hortensis* var. *guyotia* MT. : Valence en Brie (YQ) (28) avril 1956

Helix (Helix) pomatia Linnaeus 1758 : >T – bois, prairies, jardins... mais calcicole - trouvé route de la Faisanderie (forêt de Fontainebleau) adhérent à une tige mince par l'épiphragme (YQ) (7) août septembre 1952

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Le long du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Au bord du Loing entre Montigny et Grez (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

Lors de la sortie du 3 mai 1959 en forêt de Sourdun (à proximité d'Hermé) (YQ) (33)

Parcelle 240 (forêt de Fontainebleau) en octobre 1998 (GB) (40)

Parcelle 630, carrefour des Grands Feuillards (forêt de Fontainebleau) en février 1999 (GB) (40)

Parcelle 133, en face du rocher de la Salamandre (forêt de Fontainebleau) en avril 1999 (GB) (40)

Parcelles 95 et 97, la Feuillardière (massif des Trois Pignons) à Arbonne-la-Forêt, en juin 1998 et avril 1999 (GB) (40)

Cryptomphalus aspersus (O.F. Müller 1774) (= *Helix aspersa*) (Petit Gris) : >T – habitats variés : plutôt jardins, cultures, parcs... - marais de Larchant le vendredi 4 mai 1951 (P. Doignon, A. Lefebvre, J. Lasnier et L. Boyer) (41)

jardin particulier (de Fontainebleau ?) (YQ) (7) août septembre 1952

Aux environs de Nemours, le long du Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

A proximité de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux (YQ) (24) lors de l'exc. du 24 avril 1955

Theba pisana (O. F. Müller 1774) (= *Helix pisana*) : >T – milieux secs et ensoleillés ; grimpe sur la tige des végétaux par temps chaud - trouvé sur le mur d'enceinte des arènes de Montbouy (Loiret) lors de l'exc. annuelle de l'association le 25 mai 1952 (YQ) (7).

Espèce inconnue :

Helix fasciolata ? : cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

classe : Bivalvia

Ordre : Unionoida

UNIONIDAE

Unio crassus nanus (Lamarck 1819) (= *Unio batavus* Lamk.) : >AD – eaux courantes claires sur substrat sableux ou graveleux - dans la Seine dans la région de Fontainebleau (sans autres précisions, l'auteur prospectant à priori la Seine longeant la forêt de Fontainebleau), (YQ) (4) avril 1952

Nombreuses coquilles vides ou pleines jusque sur les sentiers riverains, amenés là par les rats ou l'avancée des eaux au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Présente dans le Loing (YQ) (18) juin juillet 1954

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux, à l'état de coquilles vides, (YQ) (24) lors de l'excursion du 24 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Unio pictorum (Linnaeus 1758) (= *Unio requieni* Michaud) : >AD – eaux courantes ou dormantes - dans la Seine dans la région de Fontainebleau (sans autres précisions, l'auteur prospectant à priori la Seine longeant la forêt de Fontainebleau), (YQ) (4) avril 1952

Nombreuses coquilles vides ou pleines jusque sur les sentiers riverains, amenés là par les rats ou l'avancée des eaux au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

[nda : Les données d'*Unio pictorum* antérieures à 1954 confondent *Unio pictorum* et *Unio crassus nanus*. Après cette date, *Unio pictorum* est divisé en *Unio requieni* et *Unio batavus*, qui deviendront respectivement *Unio pictorum* et *Unio crassus nanus*]

cette appellation reprend avec *Unio batavus* Lk. les données d'*Unio pictorum* qui mélangeait les deux espèces. *Unio requieni* est plus présent dans le Loing que *U. batavus* (YQ) (18) juin juillet 1954

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux, à l'état de coquilles vides, (YQ) (24) lors de l'excursion du 24 avril 1955

Dans l'île de Samois-sur-Seine, sur les rives de la Seine à l'état de coquilles vides (YQ) (25) le 15 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Unio tumidus Philipsson 1788 : >AD – eaux courantes ou dormantes - dans la Seine dans la région de Fontainebleau (sans autres précisions, l'auteur prospectant à priori la Seine longeant la forêt de Fontainebleau), (YQ) (4) avril 1952

Unio consentaneus (Ziegl.) Rossmäler (= *Unio ater* Moquin-Tandon) : >AD – grands fleuves et partie aval de leurs affluents en zone lentique - coquille abîmée de bord de Seine (sans autre précision) (laboratoire de malacologie du Muséum) (18) 1953

Pseudunio auricularius Dupuy 1850 (= *Unio sinuatus*) : cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Potomida littoralis Cuvier (= *Psillunio littoralis* = *Unio rhomboideus*) : >AD – rhéophile, rivières soumises à de très fortes crues - n'a pas encore été signalé de la région de Fontainebleau. Plusieurs coquilles vides ont été trouvées au bord de la Seine (sans autre précision) (YQ) (18) juin juillet 1954

Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) (= *Anodonta moulinsiana*) : >AD – grands lacs et étangs, fond vaseux - dans le canal de Fontainebleau lors du curage (YQ) (4) avril 1952 [nda : l'auteur cite, dans cette même publication, deux fois la même espèce avec une synonymie, *Anodonta moulinsiana*, pour le même lieu, « dans le canal du palais de Fontainebleau »]

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

dans l'étang de Villeron (YQ) (29) lors de l'exc. du 13 mai 1956

- *Anodonta cygnaea* forme *arenaria* Schröt. : sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955

Anodonta anatina (Linnaeus 1758) : >AD – eaux claires, fond plus ou moins vaseux - aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

sur les bords de l'étang de Villefermoy (près de Valence-en-Brie) (YQ) (23) lors de l'exc. du 3 avril 1955 : sujet à caution avec un jeune d'*Anodonta cygnaea*

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux, à l'état de coquilles vides, (YQ) (24) lors de l'excursion du 24 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Anodonta avonensis Montagu : cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Pseudanodonta complanata (Rossmäessler 1835) (= *Anodonta complanata*) : >AD - fond vaseux ou vaseux divers - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

SPHAERIIDAE

Sphaerium rivicola (Lamarck 1818) : >AD - dans la vase des étangs, cours d'eau lents... - à proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux, à l'état de coquilles vides, (YQ) (24) lors de l'excursion du 24 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) (= *Cyclas corneum* Brug. = *Sphaerium rivale* Drap.) : >AD - eaux courantes et dormantes - mares de la forêt de Fontainebleau (YQ) (4) avril 1952

Incorporé dans des tubes de Phryganes au bord de l'étang de Courbuisson en forêt de Fontainebleau (YQ) (9') le 8 juin 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux, à l'état de coquilles vides, (YQ) (24) lors de l'excursion du 24 avril 1955

Dans la mare du Parc aux Bœufs (forêt de Fontainebleau) (YQ) (29) lors de l'exc. du 27 mai 1956

Dans la mare du Gros Fouteau (forêt de Fontainebleau) (YQ) (30) lors de l'exc. du 5 mai 1957

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Pisidium casertanum (Poli 1791) (= *Pisidium pulchellum* Moq.-T = *Pisidium roseum* Scholtz = probablement *Pisidium pusillum* Gmel. = *Pisidium fontinale* Pfeif) : >AD - dans le Loing au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13') [nda : sont citées pour cette date deux espèces apparemment synonymes *Pisidium casertanum* et *Pisidium pusillum*]

Pisidium amnicum (O.F.Müller 1774) : >AD - eaux courantes et dormantes - dans le Loing au vieux moulin de Bagneaux, à Nemours lors de l'exc. du 27 avril 1952 (YQ) (6)

Incorporé dans des tubes de Phryganes au bord de l'étang de Courbuisson en forêt de Fontainebleau (YQ) (9') le 8 juin 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf (YQ) (31) lors de l'exc. du 9 mai 1957

Pisidium supinum A. Schmidt 1851 : >AD - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

Pisidium henslowanum (Sheppard 1823) : >AD - cité par Doignon pour le massif de Fontainebleau (37) sans autre précision 1976

DREISSENIDAE

Dreissena polymorpha (Pallas 1771) (= *Dreysensia polymorpha* = *Dreysensia fluviatilis* = *Dreysensia arnouldi*) : >AD - dans les grandes eaux dormantes : lacs, étangs, cours d'eau très lents... - dans la Seine dans la région de Fontainebleau (sans autres précisions, l'auteur prospectant a priori la Seine longeant la forêt de Fontainebleau), (YQ) (4) avril 1952

Aux environs de Nemours, dans le Loing lors de l'exc. du 31 mai 1953 (YQ) (13')

Sur les berges du Loing, aux environs de Nemours (P. Doignon, J. Vivien, H. Froment, Y. Quideau) lors de l'exc. du 25 avril 1954 (19)

A proximité du Loing aux environs de Nemours et de Bagneaux, à l'état de coquilles vides, (YQ) (24) lors de l'excursion du 24 avril 1955

Au vieux moulin de Doyer près de Nemours (YQ) (36) le 5 juin 1966

Conclusion

Ce travail est la synthèse de 48 références bibliographiques du bulletin de l'ANVL dont 40 sont d'Yves Quideau publiées entre 1952 et 1966. En 1976, Pierre Doignon, dans une synthèse sur la faune du massif de Fontainebleau, indiquait la présence de 166 espèces de mollusques pour le massif de Fontainebleau et la vallée du Loing. Ce chiffre est à revoir à la baisse.

Il nous est en effet apparu que cet auteur mentionnait des espèces qui sont strictement fossiles ou d'autres qui doivent être regroupées du fait d'une synonymie établie. La note de P. Doignon fait en outre apparaître l'ajout de plusieurs espèces sans mention de date ni de lieu de récolte et non issues des travaux antérieurs qu'il a été amené à dépouiller. C'est pourquoi les 32 taxons dont l'unique mention est issue des travaux de P. Doignon ne sont pas pris en compte dans le décompte final. Dans ce même compte, nous n'avons pas intégré les formes et variétés citées par Yves Quideau bien que nous les ayons mentionné dans la synthèse, car ces formes et variétés ne présentent pas de réelles significations taxonomiques.

Par conséquent, sur les 130 espèces citées dans ce travail, nous ne retiendront que le chiffre de **98 espèces pour le massif de Fontainebleau et les proches environs**. Toutefois dans ce décompte, nous avons relevé la curieuse citation d'espèces dont les aires de répartition sont méditerranéennes à alpines méridionales ; espèces dont la présence dans notre région n'a pas été confirmée par d'autres auteurs et qui doivent être considérées comme douteuses. Nous avons pris le parti de les maintenir dans la liste des espèces bellifontaines même s'il n'est pas possible de vérifier l'exactitude de l'information (collection de référence par exemple).

Ce travail est uniquement bibliographique et mériterait d'être mis à jour par des observations récentes comme l'a fait récemment Gérard Brusseaux. La malacologie fait encore partie des disciplines naturalistes peu répandues bien que nombre d'espèces de mollusques soient indicatrices de la valeur des milieux naturels.

Sites mentionnés

Massif de Fontainebleau	
Parking du Cabaret Masson	Fontainebleau
Rocher Cuvier / Cuvier Chatillon	Fontainebleau
Le Carrosse du Haut Mont	Fontainebleau
La Roche Eponge	Fontainebleau
A l'angle du boulevard circulaire et de la route Brossard de Corbigny (vers la Faisanderie)	Fontainebleau
La Fourche	Fontainebleau
Parcelle 68	Fontainebleau
Thomery	Thomery
Bourdon	Saint-Pierre-les-Nemours
Parcelle 630 carrefour des Grands Feuillards	Fontainebleau
Parcelle 141 champs de manœuvre	Fontainebleau
Parcelle 68	Fontainebleau
A la sortie de Fontainebleau près de la route de Melun	Fontainebleau
Le Bas Bréau	Fontainebleau
Rochers du Mont Ussy	Fontainebleau
Le Long Rocher	Fontainebleau

Vallée Jauberton	Fontainebleau
Laboratoire de biologie végétale	Fontainebleau
Voie ferrée au niveau du laboratoire de biologie végétale	Fontainebleau
Carrefour de la Fourche dans l'angle formé par les routes de Paris et d'Etampes	Fontainebleau
La Solle entre le champs de course et la route de Melun (RN5)	Fontainebleau
Marais de Larchant	Larchant
Cabaret Masson	Fontainebleau
Parcelle 97	Fontainebleau
Parcelle 240	Fontainebleau
Etang Courbuisson	Fontainebleau
Fort de Marlotte	Bourron-Marlotte
Le long du CD104 à Marlotte	Bourron-Marlotte
La Tillaie	Fontainebleau
Parcelle 134 Rocher de la Salamandre	Fontainebleau
Route de la Faisanderie	Fontainebleau
Parcelle 133 en face du rocher de la Salamandre	Fontainebleau
Mares de la forêt de Fontainebleau	Fontainebleau
Mare aux Fées	Fontainebleau
Fossé de drainage du gouffre de Larchant	Larchant
Mare du Parc aux Boeufs	Fontainebleau
Mare de l'Occident	Fontainebleau
Mare du Gros Fouteau	Fontainebleau
Mares aux Ligueurs	Fontainebleau
Mare à Piat	Fontainebleau
Parcelle 814 étangs et mares temporaires du bois des Rochettes	Fontainebleau
Massif des Trois Pignons	
Parcelles 95 et 97 La Feuillardière	Arbonne-la-Forêt
Plaine de Chanfroy	Arbonne-la-Forêt
Fontainebleau (ville)	
Parc du Château de Fontainebleau	Fontainebleau
Canal	Fontainebleau
Grille Adam Salomon	Fontainebleau
Déversoir du bassin Adam Salomon	Fontainebleau
Dans la chute du canal	Fontainebleau
Abattoir	Fontainebleau
Jardin particulier	Fontainebleau
Stade de la Faisanderie	Fontainebleau
Près du cimetière	Fontainebleau
Avon	
Viaduc de Changis	Avon
Vallée du Loing	
Etang de Souppes-sur-Loing	Souppes-sur-Loing
Nemours et ses environs	Nemours
Rochers près de Chaintréauville	Nemours
Marchais Muet (aux environs de Nemours)	Nemours
sur les Poudingues	Bagneaux-sur-Loing
Moulin de Doyer (aux environs de Nemours)	
Route de Montigny-sur-Loing à Moret-sur-Loing (vers l'aqueduc de la Vanne sur le talus de chemin de fer)	Montigny-sur-Loing
Sur les coteaux	Episy
Pont de Bagneaux	Nemours
Moulin de Bagneaux	
Entre Montigny-sur-Loing et Grez-sur-Loing	
Jardin de Jacques Dalmon	Montigny-sur-Loing
Mur de soutènement de la voie ferrée	Montigny-sur-Loing
Carrière	Dordives (45)
Etang de Villeron	Episy
Moulin désaffecté près de l'étang de Villeron	Episy

Marais	Montigny-sur-Loing
Ferme du Boulay (45)	
Arènes de Chennevière	Montbouy (45)
Fort de défense	Metz-le-Maréchal (45)
Dans un ruisseau près du Loing	Nemours
Dans l'Orvanne à l'entrée de Villecerf	Villecerf
Dans un lavoir près du Lunain	Lorrez-le-Bocage
Marais voisin au vieux moulin de Bagneaux	
Canal d'un moulin désaffecté près de l'étang de Villeron	Episy
Dans un ruisseau sur le coteau	Episy
Dans un bassin source sur le coteau	Episy
Forêt de Villefermoy	
Etang de Villefermoy près de Valence-en-Brie	Valence-en-Brie
Forêt de Sourdun	
à proximité d'Hermé	Hermé
Valence-en-Brie	
La Celle-sur-Seine	
Tufs	La Celle-sur-Seine
Seine	
Ile de Samois-sur-Seine	Samois-sur-Seine
Rives de la Seine	Samois-sur-Seine
Ile aux Barbiers	Samois-sur-Seine
Bords de la Seine à Valvins	Samois-sur-Seine
Malesherbes	
Marais de Roncevaux	Malesherbes
Buttes de la Justice	Malesherbes
Dans le premier lavoir sur un ru affluent de l'Essonne	Malesherbes
Trézan	Malesherbes

Bibliographie

- Doignon P. – 1958 – Répertoire bibliographique et analytique du massif de Fontainebleau et de la basse vallée du Loing (travaux historiques et scientifiques). Ass. Nat. Val. Loing, 56 p.
- Doignon P. – 1970 – Nécrologie d'Yves Quideau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 44, n°7-8, juillet août 1970
- Germain Louis – 1930 – Faune de France. Mollusques terrestres et fluviatiles. Première partie. Tome 21, éditions Paul Lechevalier, Paris, 477 p.
- Germain Louis – 1931 – Faune de France. Mollusques terrestres et fluviatiles. Deuxième partie. Tome 22, éditions Paul Lechevalier, Paris, 411 p.
- Glöer P. & Meier-Brook C. – 1994 – Süßwassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung
- Keith P., Guilbot R. et Cochet G. – 1998 – Mollusques, Crustacés, Arachnides et autres petits invertébrés des eaux douces. Min. env., OPIE, SPN / MNHN, CSP – 48 p.
- Kerney M.P., Cameron R.A.D. – 1979 – Land Snails of Britain & North-West Europe. Collins Field Guide
- Kerney M.P., Cameron R.A.D. (adaptation française : Alain Bertrand) – 1999 – Guide des escargots et limaces d'Europe. Delachaux et Niestlé – 370 p.
- Pfleger V. – 1989 – Guide des coquillages et mollusques. Hatier – 190 p.

www.rnde.tm.fr/fr/sa/liste/taxons

www.cscf.ch/download/liste%20especes/mollusca.txt

www.peche.org/invertebres/mollusqueCour.htm

perso.club-internet.fr/abela/Hydrobrecol.htm

- 1- Dalmon J. – 1928 – *Testacella haliotide* Drap. [Mollusques Pulmonés : Stylommatophore] dans la vallée du Loing. Bull. Ass. Nat. Val. Loing mensuel 4^{ème} année, n°6, juin 1928, p. 49-50
- 2 - Royer M.. – 1928 – Répertoire de bibliographie générale du bassin du Loing. Bull. Ass. Nat. Val. Loing mensuel 4^{ème} année, n°10, octobre 1928, p. 74
- 3 - Quideau Y. – 1952 – Gastéropodes fluviatiles et palustres trouvés dans la région de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 28 n°3, mars 1952, p. 31
- 4 – Quideau Y. – 1952 – Pélécy-podes fluviatiles et palustres trouvés dans la région de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 28 n°4, avril 1952, p. 42
- 5 – Quideau Y. – 1952 – Coquilles fournies par les tubes de larves de Phryganes. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 28 n°5, mai 1952, p. 62
- 6 – Quideau Y. – 1952 – Mollusques observés sur les bords du Loing à Nemours. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 28 n°6-7, juin juillet 1952, p. 75-76
- 7 – Quideau Y. – 1952 – Gastéropodes testacés terrestres de la région de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 28 n°8-9, août septembre 1952, p. 85-86
- 8- Quideau Y. – 1952 – Gastéropodes testacés terrestres de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 28 n°11, novembre 1952, p. 105-106
- 9 - Quideau Y. – 1953 – Mollusques de la région de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29, n°3 mars 1953, p. 40
- 9' - Quideau Y. – 1953 – Mollusques de l'étang de Courbuisson (forêt de Fontainebleau). Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29, n°3 mars 1953, p. 40
- 9'' - Quideau Y. – 1953 – Au Mont Ussy. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29, n°3 mars 1953, p. 40
- 10 – Quideau Y. – 1953 – Anomalie chez *Clausilia parvula* Stud. De Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°4, avril 1953, p. 52-53
- 11 – Quideau Y. – 1953 – Un site à Mollusques : le Rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau). Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°5, mai 1953, p. 61
- 12 – Quideau Y. – 1953 – Nouveaux mollusques trouvés au rocher Cuvier (forêt de Fontainebleau). Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°6-7, juin juillet 1953, p. 69
- 12' – Quideau Y. – Mollusques observés aux environs de Nemours. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°6-7 juin juillet 1953, p. 69 à 70
- 13 – Quideau Y. – 1953 – Malacofaune des grès calcaireux de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°8-9 août septembre 1953, p. 80
- 13' – Quideau Y. – 1953 – Mollusques observés à Nemours et Bagnaux-sur-Loing. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°8-9 août septembre 1953, p. 80-81
- 14 - Quideau Y. – 1953 – Un ver parasite de *Succinea putris* L. : *Distomum macrostomum* Rud. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°10, octobre 1953, p. 90
- 15 – Quideau Y. – 1953 – Les limaciens de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 29 n°12, décembre 1953, p. 126-127
- 17 – Quideau Y. – 1954 – Sur la systématique des mollusques de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°3, mars 1954, p. 35
- 16 – Quideau Y. – 1954 – Mollusques du massif de Fontainebleau. Espèces nouvelles trouvées en 1953. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°2, février 1954, p. 25-26
- 18 – Quideau Y. – 1954 – Sur la systématique des mollusques de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°6-7, juin juillet 1954, p. 69-70
- 19 – Quideau Y. – 1954 – Promenade malacologique au bord du Loing. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°8-9, août septembre 1954, p. 77
- 19' – Quideau Y. – 1954 – Coquilles subfossiles à Nemours. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°8-9, août septembre 1954, p. 77
- 19'' – Quideau Y. – 1954 – Anomalie chez *Unio requieni* Michaud. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°8-9, août septembre 1954, p. 77
- 20 – Quideau Y. – 1954 – Sur l'épiphage d'hiver d'*Helix pomatia*. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°10, octobre 1954, p. 87-88
- 21 – Quideau Y. – 1954 – Les variétés d'*Helix nemoralis* à Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°12, décembre 1954, p. 102-103

- 21' - Quideau Y. - 1954 - Observations. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 30 n°12, décembre 1954, p.103
- 22 - Quideau Y. - 1955 - Systématique des mollusques de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 31 n°2, février 1955, p. 15-16
- 23 - Quideau Y. - 1955 - Espèces de Valence-en-Brie. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 31 n°6-7, juin juillet 1955, p. 43-44
- 24 - Quideau Y. - 1955 - Mollusques observés à Nemours le 24 avril 1955. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 31 n°8-9, août septembre 1955, p. 52-53
- 25 - Quideau Y. - Faunule malacologique de Samois-sur-Seine. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 31 n°10, octobre 1955, p. 61
- 26 - Quideau Y. - 1955 - Contribution à la faune malacologique du massif de Fontainebleau et de la basse vallée du Loing. Travaux des Nat. Val. Loing Fasc. 12, p. 93-101
- 27 - Quideau Y. - 1956 - Malacofaune du massif de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 32 n°1, janvier 1956, p. 5-6
- 28 - Quideau Y. - 1956 - Nouvelles récoltes de mollusques à Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 32 n°4, avril 1956, p. 33-34
- 29 - Quideau Y. - 1956 - Observations. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 32 n°8-9, août septembre 1956, p. 49
- 30 - Quideau Y. - 1957 - Malacofaune des mares du massif de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 33 n°12, décembre 1957, p. 59
- 31 - Quideau Y. - 1958 - Malacofaune de l'Orvanne à Villecerf. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 34 n°1-2, janvier février 1958, p. 2-3
- 32 - Doignon P. - 1958 - La faune du massif de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 34 n°1-2, p. 6
- 33 - Quideau Y. - 1959 - Espèces observées au cours des exc.s du printemps. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 35 n°6-9, p. 81
- 34 - Quideau Y. - 1959 - Sur une forme Claire d'*Arianta arbustorum* de Valvins (forêt de Fontainebleau). Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 35 n°10-11, p. 101-102
- 35 - Quideau Y. - 1963 - Mollusques des tufs de la Celle, de Darvault et de Larchant. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 39 n°7-8, juillet août 1963, p. 76-77
- 36 - Quideau Y. - 1966 - Les sorties de juin 1966. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 42 n°9-10, septembre octobre 1966, p. 104
- 37 - Doignon P. - 1976 - La faune du massif de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 52 n°5-6, mai juin 1976, p. 59-60
- 38 - Vivien J. - *Testacella haliotide* revue dans la vallée du Loing en 1981. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 58 n°1, janvier mars 1982, p. 8
- 39 - Richer de Forges A. - 1989 - *Pomatias elegans* : l'escargot aux deux pieds. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 65 n°2, p.81-82
- 40 - Brusseaux G. - 2000 - Notes sur les mollusques du massif de Fontainebleau. Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 76 n°4, p. 166-168
- 41 - Doignon P., Lasnier J., Lefèvre A. - 1951 - Etat actuel du marais de Larchant (Hydrologie, faune, flore). Bull. Ass. Nat. Val. Loing tome 27 n°6-7, juin juillet 1951, p. 87

HISTOIRE

LIEUDITS (1)

Par Marie-Claude CAZAURAN¹

Pour essayer de comprendre la signification de certains noms de lieux, je me suis appuyée sur des constatations relevées par plusieurs auteurs :

-La désignation des noms de lieux a un caractère précis et essentiellement utilitaire : elle se base sur les particularités du paysage, particularités nécessairement stables, puisqu'elles doivent être des repères pour le paysan : une source, un accident de terrain, une roche, un arbre remarquable indiquent les directions à prendre dans la campagne et reçoivent un nom significatif pour la communauté : La Fosse aux Boulains (la fontaine -ou l'habitation ?- aux bouleaux), la Fosse aux Fagots (aux hêtres), la Gorge aux Loups, le Bignon (pièce de terre marécageuse alimentée par une source), la Roche à Blain (Bélénos ?), Trefols (les trois hêtres), le Puits du Cormier, la Butte aux Aires (aïrelles ?)...

-Le manteau végétal, en particulier, tient une place importante dans la toponymie : du quatrième millénaire av. J.C. jusqu'à nos jours, on constate la permanence de l'habitat aux lisières des forêts, où buissons et boqueteaux forment pour le village un appoint si nécessaire à la vie de la communauté que, parfois, le nom du fruit représente l'arbre et même l'endroit planté .

-Le Gâtinais est à l'écart des grandes voies de communication où Rome affirmait son prestige et , par ailleurs, il est l'avancée la plus méridionale des civilisations nordiques (2), Campigiens à l'aube du néolithique venus par la Sambre et l'Oise, Celtes, Belges, Francs. Les découvertes archéologiques le confirment : un ciseau à bois décoré, apparenté aux productions du nord de l'Europe à l'Age du Bronze, a été trouvé dans la Seine ; dans la vallée de l'Yonne, de nombreuses perles d'ambre dans les sépultures provenaient de la Baltique par le Rhin ; les celtes Parisii copiaient une monnaie des belges Ambiani ; les gallo-romains, à Meaux, utilisaient des monnaies de type belge prononcé .

À l'aube de notre ère, selon Vitruve, architecte romain du 1^{er} siècle après J.C., c'est de bois et d'écorces (3) que sont faites les habitations, et de roseaux les toits ; dans des tenures proches, on sème le chanvre et le genêt, qui est coupé tous les quatre ans et sert de combustible et de pâture. On se nourrit de bouillies d'orge, on boit du kourmi, sorte de bière sans houblon, à base d'orge fermentée, de sève de printemps du bouleau, de fruits du cormier, l'alisier domestique, et, selon Diodore de Sicile, historien grec du 1^{er} siècle av. J.C., du jus provenant du lavage des cires d'abeille (inscription sur un peson de fuseau : « *nata vimpi, kurmi da !* » (4)), on soigne ses rhumatismes avec des baies de genévrier macérées dans de la graisse de blaireau. On retrouve encore des traces de cette vie rude dans les noms des terroirs.

Les paysans du Moyen-Age, respectueux de la sagesse des anciens, restaient fidèles à des qualificatifs frappés du sceau du bon sens (5) ; cela devait donc les empêcher d'avoir recours, pour préciser des lieux, à des noms d'animaux, qui sont des corps toujours en mouvement : or se glisse subrepticement, aux détours des chemins, tout un bestiaire fourni en animaux de toutes sortes, ailés ou à quatre pattes, qui contredisent cette règle d'immobilisme : nous trouvons en effet des coqs, des chèvres, des cerfs, des merles, des pies, des cailles, des corbeaux, des loups. Il faut donc admettre que sont venues se greffer, à des périodes plus récentes, des déformations sorties d'imaginaires malicieuses,

¹ 90, rue de Paris, 77140 Nemours

oublieuses du passé ou mal intentionnées ; je me suis efforcée de retrouver, derrière ces noms d'emprunt, d'autres qualificatifs plus appropriés à leur environnement immobile.

- Le coq : Coquibus, en forêt de Fontainebleau, la Roche au Coq à Saint-Pierre-lès-Nemours, le Cocluchon, près de Souppes, la Mardelle (au sens de ferme) au Coq, près de Courtenay, sont des lieux isolés, élevés, boisés, le coq, animal domestique, ne s'y risquerait pas. *Cucq*, par contre, de racine pré-indo-européenne (6), qui signifie sommet arrondi, paraît convenir. *Bus*, en francique, signifie buis ou, par extension, bois (7) : Coquibus serait donc une hauteur couronnée de buis, la Roche au Coq un massif rocheux élevé, le Cocluchon un sommet païen associé à la lumière (8), *Lux*. Chante Coq serait le versant d'une colline (*Chante*, par mouillement de la consonne, dérive de *Cant*, comme dans Larchant, du gaulois *Cambo*, signifiant courbe (9)) et Pisse Coq serait un filet d'eau, *pisse*, qui coule d'un petit sommet.

- La chèvre : Chevrainvilliers, Chevry en Sereine (Seine et Marne), source de Chevrü (Loiret) : dans notre région, les archéologues n'ont exhumé que bien peu d'ossements de chèvres, animaux plus méridionaux : il doit plutôt s'agir ici d'une déformation de *caput rivi*, tête de rivière en latin (*caput* a donné *chef*, le F s'est adouci en V, comme dans *chevet*, et *rivi* a donné *ru*) ; une source est une dénomination plus fiable que quelques chèvres broutant ici et là. Dans Sereine se trouve le radical pré-indo européen *Sar* (10), comme dans les Sorins, sources à Blennes, ou comme dans le Serein, rivière de l'Yonne. Chevry-en-Sereine serait donc le départ d'une petite rivière, et la source de Chevrü, un pléonisme dû à l'oubli du premier sens de Chevrü. Il existe également un Chaveuil construit de la même façon : *Caput Ialo*, fontaine de la clairière.

-Le merle : La Fontaine aux Merles, Chante Merle, près de Voulx : pourquoi seuls ces oiseaux s'y désaltéreraient ? Quelles raisons obscures les pousseraient à venir en nombre auprès d'une fontaine qu'ils apprécieraient particulièrement ? Il doit s'agir d'une précision moins poétique et plus utilitaire : *marle* est issu du gaulois *margila*, marne, utilisé comme amendement dans les champs ; la marne est un mélange de calcaire, d'argile et d'un peu de sable, Pline en attribue la découverte aux gaulois. Chante Merle serait donc *Canto Margila*, lieu marneux.

-Le cerf : Villercerf, Seine et Marne : voici un animal peu enclin à sortir de ses fourrés ; on se souvient du sort qui lui a été réservé quand il a demandé à être caché dans une étable, sort dramatique que nous décrit La Fontaine dans la fable « l'oeil du maître. ». *Cerf* est issu d'*exsartare*, défricher, qui a donné Les Essarts, ou peut-être simplement de *sarire*, sarcler : ce sont des terrains défrichés, ou remplis de broussailles après abandon.

- Les pies : La mare à Pies dans les bois de Darvault, la mare à Piat en forêt de Fontainebleau ; les pies ne se pressent pourtant pas dans ces taillis, elles préfèrent les lieux cultivés pour se nourrir : il pourrait bien alors s'agir d'une mare aux pluies, dépression naturelle dans du grès imperméable, alimentée uniquement par l'eau du ciel : déformation par relâchement d'articulation ; je dis bien « cabajouti » pour cabane à outils !

- Les cailles : Boissy-aux-Cailles (qui s'appelait naguère Boissy-le-Repos, association du buis et d'un cimetière ancien) : il s'agit du terme gaulois *caio*, terrain caillouteux, ou champ ; on trouve entre Beaune la Rolande et Egry une Fontaine d'Ecaille, qualificatif bien singulier qui s'explique par une incompréhension de la coupe des mots : Fontaine des Cailles, Fontaine des Cailloux ou des Champs (de la même façon, Fontaine de l'Assault, pour la Saulx, endroit planté de saules).

- Les oisons, les oiseaux : Culoiseau, près de Nanteau, Chantoiseau, Villoseau, en Seine-et-Marne, Oizy, Oison dans le Loiret, Sourdoison : même principe de déformation des mots par transmission orale : il doit s'agir du radical pré-latin *Os*, *Ous*, montagne, d'où dérivent *Ous*, *Ousson*, rivière et *ausarium*, osier. Culoiseau, c'est le fond d'une dépression marécageuse alimentée par une rivière et signalée par

un menhir : confortant cette hypothèse, nous trouvons dans la Revue de La Physiophile, N° 134, juin 2001, de la plume de R. Chevrot : « La Pierre à Loiseau... dans le pré en contrebas, à proximité d'un trou d'eau il y a une grosse pierre isolée. ». Sourdoison, ce n'est pas un volatile sourd, c'est l'association de *Sourdis*, petite source en latin, et de *Oys*, osier. Oizy, c'est *Oys* + *Iacos*, lieu planté d'osiers. Pisse Oison, dans la Mayenne, était sans doute une petite rivière associée à des osiers. « Dans la ferme de Chantoiseau naît un petit ru intermittent ».

- Les loups : ce toponyme, qui est extrêmement fréquent, a du représenter l'eau, *leu*, *lu*, donc la source plus précisément, et la clairière qui l'entoure, il a pris de ce fait un caractère sacré : Henri Vincenot (11) l'associe au dieu Lug, dieu de la lumière, et c'était également un animal chtonien, qui accompagnait les morts ; le christianisme a rejeté ce culte de la nature, mais les sanctuaires à répit montrent la persistance de l'attachement des paysans à ces vieilles croyances.

- Les hommes, oublieux du passé : L'Homme, Pierre-le-Sot, Foljuif. L'Homme, c'est l'orme, Pierre-le-Sot, c'est Pierre-le-Sault, de *Saltus*, forêt pâturée. Foljuif est plus énigmatique : quels étaient ces juifs qui avaient perdu l'esprit et qui s'étaient retirés dans des endroits déserts, en grand nombre, car on ne compte plus dans nos régions des Foljuif, par exemple, près de Nemours, près de Bougigny ; également des Foujuif, Faujus, Fouju, Valfaujuif, Foljuif-la-Fosse, et même, abomination, la Mort aux Juifs, près de Ferrières-en-Gâtinais. Il doit s'agir d'une transcription malveillante des clercs qui ont réussi à abattre deux ennemis à la fois, les païens en les éliminant, les juifs en les ridiculisant.

Voici pourquoi, à mon avis : le premier terme n'est pas inconnu, nous le trouvons également dans Chamfou, Champfoui, le champ du hêtre ; *fol*, *fou*, dérivent de *fagus*, le hêtre en latin, le Fagutal était un arbre sacré de Rome et dans nos pays, les arbres remarquables étaient également attribués à une divinité. Ici, Jupiter dont le génitif *Jovis* était utilisé plus communément et qui a donné *Juve*, *Jus*, *Ju*, *Jui*, comme dans Juvisy. Le F a remplacé le V, comme dans clef, *clavus*, ou cerf, *cervus*. Foljuif signifierait donc tout simplement le hêtre de Jupiter, *fol Jovi*, et la Mort aux Juifs aurait été un étang sacré.

Les exemples ci-dessus tendraient donc à illustrer les règles énoncées au début, puisque tous ces toponymes pourraient se référer à des particularités du sol ou de la végétation, parfois divinisées. Ne pourrait-on pas alors appliquer le raisonnement à des noms de localités trop souvent attribués, dans les livres de toponymie, à des propriétaires fonciers gaulois ou romains ? Il semble, en ce qui concerne les gaulois au moins, que ce soit le nom du lieu qui soit à l'origine du nom de famille : Bourbon signifie eau bouillonnante, Condé, confluent, Coligny, lieu planté de houx. Quant aux romains, ils n'allaient pas s'enterrer dans des hameaux perdus, loin du *limes*, la frontière, et loin des villes.

Dans cette optique végétale, je me suis intéressée à deux radicaux, *Corb* et *Egr*, qu'on trouve dans de nombreuses localités :

- Corb : Lieux dits, villages et villes innombrables dans toute la France : Corbeil (Essonne), Corbeilles, Montcorbon (Loiret), Corbeil-Cerf (Oise) où Cerf indique l'existence d'un lieu planté ancien, Corbeval en Seine-et-Marne, Corberon, près de Chateaubeau, Corbasson, dans le Gâtinais sud, gril de Corbelin, abbaye de la Corbie, dans la Somme, ville médiévale de Corbon, près de Montagne-au-Perche, site antique de *Corbilo*, près de Nantes (12), les Corbières...

Corbeil viendrait du nom d'homme gaulois *Corbus* + *ialo* (13), Corbeilles du nom d'homme gallo-romain *Corbelius*, Corbel de l'ancien français *Corbel*, corbeau, employé comme surnom, Corbie, du nom d'homme *Corbus*, surnom le Corbeau, etc... On peut s'interroger sur les motivations de ceux qui prenaient le nom d'un oiseau somme toute peu sympathique, et avec empressement, étant donné le nombre de localités qui en ont gardé le souvenir. Et de là à penser qu'il pourrait s'agir simplement de

corbeaux, il n'y a qu'un pas, mais cela ne convient pas non plus, puisque nous avons vu qu'un lieu ne pouvait se définir par la présence sporadique et aléatoire de volatiles.

Quelques noms d'oiseaux nous mettent sur la voie : le chardonneret est ainsi nommé parce qu'il affectionne les chardons, la pie agace aime les pommes sauvages appelées *agacia* dans le Bas Gâtinais, la pie grièche et la grive se nourrissent de griottes, le chouca est appelé cornouillet ou cornillat, peut-être pour son goût des cornouilles, le cerisin est un des surnom du serin (14). Pourquoi alors ne serait-ce pas de son goût pour les baies du cormier que le corbeau aurait tiré son nom ? Chaque village avait ses vergers clos où étaient plantés le cormier, sorbier domestique, pour ses baies et son bois très dur, le cornouiller, le prunellier, le poirier aux fruits aigres ; or, le fruit du cormier est appelé corbe, et le fruit pouvait désigner l'endroit planté. Nous aurions là une base végétale stable. Cette hypothèse se trouve confortée par l'origine acceptée par les toponymistes de Corneilles, *Curmiliaca*, *Korma + iaco*, lieu planté de cormiers (15). Montigny-les-Corneilles aurait donc été une ferme entourée de cormiers, et *Corb* serait une autre forme du gaulois *Corm* (*corbis*, en latin, veut dire corbeille).

- *Egr* est contenu dans Egreville, Egry, Egriselles-le-Bocage. Le nom de cette dernière localité aurait pour origine *Aecclesiolae*, agglomération autour d'une église : on a peine à le croire, et on pense plutôt à une approximation pieuse des scribes. Un documentaire à la télévision sur le désert des Agriates, en Haute Corse, domaine du houx, des arbousiers aux fruits aigres, m'a incitée à rechercher une origine végétale à ces noms.

Il existe un nom gaulois du prunellier qui paraît très bien convenir : *agreno* (16) ; d'autre part, les pommiers et les poiriers sauvages jeunes étaient appelés *agrons*, et *agrone* est la prunelle. Ce radical exprime tout ce qui est âcre, aigret, acidulé, on le retrouve également dans griotte, le fruit du cerisier, qui était appelé *aigriotte* au temps d'Olivier de Serres, au XVI^{ème} siècle. Egreville, *Acrivilla* en 1164, transformait-elle en boissons alcoolisées ces fruits à moitié sauvages ?

Le nom d'Egry, dans le Loiret, viendrait du nom d'homme *Agririus* + suffixe collectif *etum*, mais comment expliquer alors le nom de la rivière Egry ? On ne donnait pas le nom d'un homme à une rivière. Or, les sources et les rivières étaient bordées d'arbustes, dont elles prenaient parfois le nom : l'Alizone, pour les aliziers, la Corbie, *Corbeia* en 657, ancien nom de la rivière Ancre à Corbie pour les sorbiers, pourquoi alors la rivière Egry n'aurait-elle pas été bordée de prunelliers ? Il existe également une rivière Aigre, dans le Loiret. Au bord de l'Yerre, près de la ferme d'Egrenay, on a trouvé des haches polies et un petit polissoir, à Agrès, en Charente, a été découvert un casque du IV^{ème} siècle avant J.C., ce qui prouverait l'ancienneté de ces lieux.

- Les puits sont d'autres témoins des activités humaines, et ils seraient à l'origine de Puiseaux, dans le Loiret, du Puy, de Puiselet, en Seine-et-Marne. Mais il existait des puits dans tous les villages, ce n'était donc pas un signe distinctif, à moins de recevoir un qualificatif précis - le Puits du Cormier, par exemple, en forêt de Fontainebleau. Ces noms viendraient de *puteus*, puits en latin ; or, on trouve une autre orthographe pour Puiseaux, en 1664, *Puyseaux*, le Y est révélateur, comme dans le Puy : le radical serait alors *Podium*, qui signifie en latin petite élévation, soubassement, balcon ; il a donné tous les Puy, Pouy, Poey, Puig d'Auvergne. et dans le nord, il a donné *Puy* (17) Le Puy, Doubs. Puiseaux est située sur une légère éminence que l'on voit de loin, Puiselet a tout-à-fait l'allure d'un balcon haut perché. N'y aurait-il pas eu attraction de puy par puits, plus compréhensible pour les scribes ? Que penser de La Puisaye, doucement vallonnée (18) ?

Ces quelques lignes sont le résultat de réflexions solitaires, et demandent donc l'indulgence, ce sont des pistes à défricher ou à abandonner. On ne peut pas trouver dans la seule toponymie « des lumières chronologiques », et beaucoup de microtoponymes ne datent sans doute que des 11^{ème}, 12^{ème} siècles (19) ; il faut donc les associer aux recherches archéologiques, aux sciences de la nature, pour essayer de retrouver la faible trace de nos ancêtres.

Bibliographie et notes

- 1.- R. Nicolas , Terre Vive, Semina, N° 117, mars 2000 : « ne vous donnez pas la peine d'écrire des lieux dits, la légère réforme « conseillée » par l'Académie française propose lieudit en un seul mot avec un pluriel simple : lieudits. Ecrivez de même ognon, nénufar, prunelier ».
- 2.- L.R. Nougier, *Géographie humaine préhistorique*, Librairie Gallimard, 1959, p.251 : « Certains personnages influents se romanisent, tandis que l'ensemble de la population en reste encore au stade néo-chalcolithique.
- 3.- Dictionnaire Robert de la langue française : « bâtir, francique *bastjan*, construire avec de l'écorce. »
- 4.- P.Y. Lambert, *La langue gauloise*, Editions Errance, 1995, p. 123.Trad : jolie fille, donne-nous de la cervoise.
- 5.- J.Legoff, *Pour un autre Moyen-Age*, N.R.F., Editions Gallimard, 1978, « les structures paysannes étaient douées d'une grande résistance au changement ».
- 6.- A. Dauzat, *Les noms de lieux*, Librairie Delagrave, 1947, p. 209 : *Cuccu*, hauteur arrondie.
- 7.- L. Guyot et P. Gibassier, *Les noms des arbres*, P.U.F., p. 24 : buis, celtique *beus*.
- 8.- L'aconit tue loup, poison narcotique violent , appelée Coqueluchon jaune, est une plante des pentes rocailleuses ombragées, très rare en plaine.
- 9.- P.Y. Lambert, op. cité, p. 195 : *Cambo* « courbe », *Cambo-ritum* « gué courbe », Chambord. A donné « jante ».
- 10.- *Sar*, pré indoeuropéen : hauteur, *Sor* : source jaillissante, Dictionnaire Etymologique des noms de lieux en France, Dauzat Rostaing, Librairie Guénégaud, 1963.
- 11.- H. Vincenot, *Les paysans bourguignons au temps de Lamartine* ».
- 12.- D. et Y. Roman, *Histoire de la Gaule*, Editions Fayard, 1997, p. 344 : « Narbonne et *Corbilo* (région de Nantes), les villes les plus importantes du pays », Scipion Emilien, 2ème siècle après J.-C..
- 13.- A. Longnon, *Les noms de lieux de la France*, Librairie Honoré Champion, 1979.
- 14.- M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural, Editions Fayard, 1997, *Les mots du passé*.
- 15.- M. Mulon, *Noms de lieux d'Ile-de-France*, Editions Bonneton, 1997, p. 45 : « pour Corbeil, on a proposé un nom de personne latin *Corbus*, ou gaulois *Corobus*, ce qui n'emporte pas la conviction. p. 167 : Corneilles-en-Parisis : on y voit un dérivé à forme collective du gaulois *corma*, fruit du cormier. »
- 16.- P.Y. Lambert, p.186 :« *Agreno* est directement apparenté au nom celtique de la prunelle »
- 17.- A. Dauzat, Ch. Rostaing, Librairie Guénégaud, 1963 : *Podium* a donné dans le nord Puy ; ex : Le Puy, Doubs.
- 18.- F.P. Chapat, *La Puisaye au temps des ferriers*, Editions de Civry, 1981 : Challe, puis Née de la Rochelle proposent comme étymologie Podaceaia, de *Podium*, qui a donné Puy (lieu élevé).
- 19.- Histoire de la France Rurale, direction G. Duby, Editions du Deuil, p. 450, p. 430.

Numéro CPPAP : 65 832

Dépôt légal : 1er trimestre 2002

Classification UNESCO : 11/0 n° 77-25551-1

Directeur de la publication :

Jean-Philippe SIBLET

3, allée des mimosas

77250 ECUELLES

LA FORÊT DES ARTS

**LIBRAIRIE NATURE - GALERIE NATURE
CARTERIE - SALON DE THÉ**

*vous accueille maintenant à BARBIZON, 16 Grande Rue
(en face de la mairie).*

*A travers les thèmes de la forêt, du cheval et de la nature sauvage, la Librairie Nature vous propose l'essentiel des ouvrages des Éditions Delachaux et Niestlé, Hesse, Transboréal, Pôles d'images, Belin, Nathan, Bordas... **

Quant à la Galerie d'art naturaliste, elle réunira pour vous au fil des saisons les oeuvres de peintres, sculpteurs et photographes de renom :

Eric Alibert, Jean CHEVALLIER, Jacques RIME, Robert Hainard, Pierre BAUMGARTH, Anne STEINLEIN, Sylvie ROUBÈS, Jean VASSIL, Olivier GRUNEWALD...

Venez poursuivre vos randonnées en forêt autour d'un chocolat chaud ou d'un café du Brésil, nous pourrions parler nature, art, voyages et vous présenter les dernières publications naturalistes.

Nous attendons votre visite.

A BIENTÔT !

*La Forêt des Arts ouvre ses portes samedi et dimanche toute la journée, et en semaine tous les après-midi.
Fermeture le mardi.*

** Une remise de 5% sur le prix de tous les ouvrages sera systématiquement accordée aux membres adhérents de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau ...*

**La forêt
des Arts**

**Galerie
d'art animalier
Librairie
Nature et Cheval
Carterie
Salon de thé**

**16, rue Grande
77630 Barbizon**

01 60 69 24 63